


JAHRBUCH DES OBERÖSTERR. MUSEALVEREINES

83. BAND.



LINZ 1930.

VERLEGER: OBERÖSTERR. MUSEALVEREIN.

DRUCK DER BUCH- UND STEINDRUCKEREI J. WIMMER, LINZ. 3754 30

Inhalt.

	Seite
1. Vereinsberichte	5
2. Berichte der wissenschaftlichen Landesanstalten (Landes- museum, Landesarchiv)	11
3. Beiträge zur Landeskunde:	
R. Klug, Johannes Kepler in Oberösterreich	59
E. Trinks, Die Gründungsurkunden und Anfänge des Benediktinerklosters Lambach	75
C. Schraml, Die Entwicklung des oberösterreichischen Salzbergbaues im 16. und 17. Jahrhundert . . .	153
Nachruf: Franz Thalmayr (H. Ubell)	243
H. Steinbach, Die Vegetationsverhältnisse des Irrsee- beckens	247
F. Göhlert, Hydrographische und hydrobiologische Untersuchungen der Ödseen in Oberösterreich	339

Nußbaum liefert Holz für Wohnungseinrichtungen. Die Lager bei den im u. G. besonders von früherer Zeit her häufigen Wasserwerken muß der Holzbirnbaum liefern. Die Rippen der Boote macht man aus dem Holz des Zwetschkenbaumes. Für Wagnerarbeiten nimmt man das Holz der Esche; aus diesem bestehen auch die landesüblichen „Dreschstöcke“. (Nicht Dreschflegel!)

Abermals können Raummangels wegen die vielen vom Verfasser aufgenommenen Einzelassoziationen im Fichten-, Buchen- und Mischwalde nicht angeführt werden; die sie bildenden Vertreter mögen wieder aus der Artenliste ersehen werden.

II. Artenliste.

(Fundortskatalog.)

Die Bezeichnung „Standort“ für „Fundort“ wurde bei allen Angaben sorgfältig vermieden, da nach den neueren Ansichten unter „Standort“ nur eine bestimmte Örtlichkeit im Hinblick auf die ihr eigenen, auf die Pflanze wirkenden Einflüsse verstanden werden darf.

Die angeführten Pflanzen wurden in den allermeisten Fällen vom Verfasser selbst gefunden und registriert, wo aber ein anderer Finder oder Autor in Betracht kommt, ist dies ausdrücklich bezeichnet. (Dr. St. = Dr. Ferdinand Strauß, Hi. = Rudolf Hinterhuber, S. F. = Schulrat Alfred Feichtinger, O. R. = Oberforststrat Franz Ressel, Dir. P. F. = Direktor Pius Fürst, Dr. Z. = Dr. Hans Zumpfe, S. B. = Schulleiter Karl Brandstötter, Pf. S. = Pfarrer Konrad Schinkinger, D. = Dr. Johann Duftschmid, E. R. = Engelbert Ritzberger, He. = Hegi, Flora von Mitteleuropa, Fr. = Fritsch, Exkursionsflora 1922.)

Die Nomenklatur hält sich im allgemeinen an die Exkursionsflora von Karl Fritsch, 3. Auflage, 1922; dort aber, wo der Verfasser glaubte, daß die in diesem Buche als eigene Arten angeführten Pflanzen bloß als Subspecies einer Art anzusehen seien, wurden die Bezeichnungen größerer Werke (Hegi, Hallier) verwendet. Deutsche Bezeichnungen (zumeist nach Fritsch) wurden auf Wunsch der Schriftleitung in Klammer beigelegt; Wert legt der Verfasser auf die von ihm erfragten unter Anführungszeichen stehenden Volksnamen. Die erst gegen Norden, gegen das „Landl“ zu gebräuchlichen Bezeichnungen erhielten den Vermerk La. Ganz besonders soll auf Bezeichnungen aufmerksam gemacht werden,

die in der Wiener Gegend und meist auch in anderen Strichen unseres Vaterlandes ganz anderen Pflanzen gegeben werden als hier; so: „Stoaklee“ (Steinklee) für *Trifolium strepens*, der eigentliche Steinklee (*Melilotus* off.) fehlt, *Melilotus albus* siehe Liste! „Weißbuachn“ für Birke, während *Carpinus betulus*, unsere Weißbuche, nur „Hoanbuchn“ (Hainbuche) genannt wird; „Heanadarm“ (Hühnerdarm) für *Ranunculus repens*, während unser Hühnerdarm (*Stellaria media*) „Zeiserlkraut“ heißt; „Hirschzungen“ für die Blätter von *Polygonum bistorta*, die eigentliche Hirschzunge (*Scolopendrium vulgare*) ist kaum bekannt (Artenliste!); „Tuifelsabiß“ (Teufelsabbiß) ist fränkisch und wird nur gegen den Attergau zu für *Potentilla erecta* verwendet, während der eigentliche Teufelsabbiß (*Succisa pratensis*) unbenannt bleibt; „Segenbaum“ für *Juniperus sabina*, während unser Segenbaum, die Thuja, „Zederer“ heißt; „Wintergrün“ für *Hedera helix*, usw.

Außer sp. wurden subps., var. und f. nur dort angegeben, wo es dem Verfasser zweckdienlich erschien, zur Kenntnis der Verbreitung der Formenkreise beizutragen. Wo nicht anders bemerkt, handelt es sich um die typische Form. „Niedere Lagen“: Beckengrund bis 600 m; „mittlere Lagen“: 600—800 m; „höhere oder hohe Lagen“: 800 m bis zu den höchsten Gipfeln des u. G. (1115 m).

„Wird gesammelt“ heißt, wird zwecks Verkaufes an Kräutersammelstellen gesucht; „Verwendung“ dagegen heißt: Gebrauch durch die Einheimischen; in diesem Falle wird die Art des Gebrauches, wenn dem Verfasser bekannt, angeführt. Die Kenntnis und Verwendung der Heilkräuter ist in den letzten Jahrzehnten leider fast vollständig verloren gegangen.

Angaben über Verbreitungsverhältnisse sind gemäß der Skala von Oswald Her und Thurmann nach den 10 Stufen gemacht: 1. Äußerst selten. 2. Sehr selten. 3. Selten. 4. Ziemlich selten. 5. Sehr zerstreut. 6. Zerstreut. 7. Ziemlich verbreitet. 8. Verbreitet. 9. Sehr verbreitet. 10. Äußerst verbreitet.

Bei der Bezeichnung über die Art des geselligen Vorkommens wird nach Braun-Blanquet fünfstufig angegeben: einzeln, gruppenweise, truppweise, scharenweise, herdenweise.

Die Angaben über das Verhältnis der Pflanze zu Kalk und Feuchtigkeit sind zum Teile Hegi entnommen, zum Teile sind sie allbekannt oder gründen sich auf eigene Erfahrung.

Angaben, in wieviel Häusern diese oder jene Pflanze gebaut wird, und Ähnliches verdanke ich Herrn S. B. und Herrn Pf. S. Die Bezeichnung „Wurzgarten“ bezieht sich auf die nach altem Brauche in der Nähe der Gehöfte, mitten auf der Hauswiese stehenden Bauerngärten, die meist Quadratform (Seitenlänge 6—10 m) haben und von Holzlatten eingezäunt sind. Unter „Vor-

gärten“ sind die Gärtchen der Nichtbauern verstanden. In „Gärten“ vorkommend heißt: in Wurz- und Vorgärten.

Von den unter Obhut des Menschen stehenden Pflanzen können wertvolle Schlüsse auf die Bodenbeschaffenheit und die Kultur der Gegend gemacht werden.

Endlich schien es dem Verfasser notwendig, Vorkommnisse wichtiger Pflanzen in den Nachbargebieten zu berücksichtigen.

Sollten Pflanzen übersehen worden sein, so glaubt der Verfasser doch, daß das Gesamtbild der Gegend durch die folgende Liste genügend scharf gezeichnet wird.

Pteridophyta.

Filicinae.

Polypodiaceae.

- Polypodium vulgare* L., var. *commune* Milde. (Gemeiner Tüpfelfarn). Sehr selten. Westhang, oberhalb Haubner. Osthang beim Ramsauerbach, oberhalb der Straße.
- Blechnum spicant* (L.) Sm. (Gemeiner Rippenfarn). Äußerst verbreitet, bes. auf den östl. H.⁵⁵); feuchtigkeitsl.
- Nephrodium oreopteris* Desv. (Berg-Wurmfarn). Ziemlich verbreitet auf den östl. H.; feuchtigkeitsl.
- N. phegopteris* (L.) Prantl (Buchenfarn). Osthang des Irrsberges, oberer Vöcklalauf.
- N. dryopteris* Michx. (Eichenfarn). Mittlere Lagen, Lackenberg, Irrsberg. Feuchtigkeitsl.
- N. filix mas* (L.) Rich. (Echter Wurmfarn). Das eigentliche „Farmerkraut“. Irrsberg und Mondseeberg noch ziemlich verbreitet, sonst stellenw. ganz ausgerottet. Wird gesammelt (Ausgraben des Rhizoms).
- N. spinulosum* Strempel (Dornspitziger Wurmfarn). Lackenberg oberhalb Guggenb., sehr zerstr., truppw.
- Asplenium ruta muraria* L. var. *Brunfelsii* Heufl. (Mauer-Streifenfarn). Äußerst selten. Friedhofsmauer.
- A. trichomanes* L. (Schwarzstieliger St.). Selten. Zellerbach 650 m, Hausstättergraben.
- A. viride* Huds. (Grüner St.). Sehr selten. Zellerbach.
- Aspidium lonchitis* L. (Lanzen-Schildfarn). Selten. Zellerbach, Steiningerbach. (Also östl. u. westl. H.)
- Athyrium filix femina* (L.) Roth (Gemeines Frauenhaar). Weit häufiger als *N. filix m.* Feuchte Waldstellen. Verbr. auf dem Irrsberg und Lackenberg.
- Scolopendrium vulgare* Sm. (Gem. Hirschzunge). 1. Oberhalb d. Dorfanger (sehr kalkhaltige Stellen). 2. Bei Ruine Wildenegg. Äußerst selten, Kalk bevorzugend.
- Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn (Gemeiner Adlerfarn). Kolomannsberg und Lackenberg zerstr. Vorwäldchen des Irrsberges. Herdenweise. Kalkarme Böden.

⁵⁵) H.: Hang oder Hänge.

Equisetaceae.

Die Equisetaceae sind im u. G. ungemein häufig und auffallend, in ganz sauren Wiesen tonangebend.

Equisetum arvense L. (Acker-Schachtelhalm). Äußerst verbr., ungemein lästiges Unkraut. „Katzenschwanz“. Bevorzugt feuchte, lehmige Sandböden.

E. telmateja Ehrh. (Zinnkraut). Sehr verbr., herdenweise. Beide H. Wird gesammelt. Verwendung gegen Wassersucht. Putzmittel.

E. palustre L. (Sumpf-S.). Sehr verbr., herdenweise. Löst an feuchter werdenden Stellen regelmäßig *E. arvense* ab.

E. limosum L. (Schlamm-S.). Sehr verbr. 1. Vorgebiet des Moores I. 2. Einen Teich ostwärts von Zell mit *Castalia alba* ganz ausfüllend. 3. Niedermoore nördlich des Sees. In den Niedermooren ohne, im großen Tümpel mit Seitenästen.

E. silvaticum L. (Wald-Schachtelhalm). Sehr verbr., weil feuchtigkeitsliebend, auf beiden H.

E. hiemale L. (Winter-Sch.). Zerstr. Hausstättergraben, Moränengebiet.

Lycopodiaceae.

Für die Gegend charakteristisch, da sie eine gleichmäßig durchfeuchtete Atmosphäre verlangen. (Die Lycopodiaceae sind umso verbreiteter, je mehr sich eine Gegend dem ozeanischen Klima nähert.)

Lycopodium annotinum L. (Sprossender Bärlapp). 1. Lichte Waldbestände östl. der Niedermoore ober dem See. 2. Vorgebiet des Moores I. Zerstr., gruppenw.

L. inundatum L. (Sumpf-B.). Sumpfwiese nördl. des Sees. Selten.

L. clavatum L. (Keuliger B.). In mittleren und höheren Lagen der Nadelwälder und in trockenen Teilen beider H. verbr. Wird gesammelt.

Gymnospermae.

Coniferae.

Taxus baccata L. (Gemeine Eibe). „Eimatsgroaßat“ oder „Eibatsgroaßat“, auch „Eibischgrasser“. Da Vorliebe für kalkhaltigen Boden, im benachbarten Kalkgebiet (Griesberg) als Unterholz der Nadelwälder häufig (Eibensee). Früher zweifellos auch im u. G. häufiger („Eibenboden“ oberhalb Wegdorf, Eibersberg); jetzt fast nur geschützt in Hausnähe (zu den neun geweihten Pflanzen gehörig) und nur vereinzelt wild. (Kleiner Bestand oberhalb des Nußbaumers.) Hi. bemerkt schon die starke Abnahme. Urwüchsig: Früchte in den Pfahlbauten bei Mondsee. (Sammlung Much.)

Picea excelsa Link (Gemeine Fichte). Der herrschende Baum im u. G.

Juniperus communis L. (Gemeiner Wacholder). „Kronawetter“. Sehr zerstreut auf den Moorwiesen.

J. sabina L. (Gemeiner Sadebaum). „Segenbaum“. Verwendung als Abortivum. In Hausgärten nur künstlich erhalten.

Larix decidua Mill. (Europäische Lärche). Ziemlich selten. In die Fichtenbestände zweifellos nur mit Sämlingen gekommen.

Pinus silvestris L. (Gemeine Föhre). Sehr selten und meist angepflanzt.

P. montana Mill. (Leg-Föhre). Die Moore I und II auffüllend. Nach Vierhapper „Zirbe und Bergkiefer in unseren Alpen“ der Pumiliotypus. Auch Sendtner bezeichnet *Pinus pumilio* als Silikats- und Hochmoorpflanze.

Thuja orientalis L. (Orientalischer Lebensbaum). „Zederer“. Hausnähe. Für Palmbuschen.

Abies alba Mill. (Weißtanne). In Fichten- und Mischwäldern. Vereinzelt o. truppw. Ursprünglich: Nadeln in den Pfahlbauten von Mondsee. (Sammlung Much.)

Angiospermae.

Dicotyledones.

• Choripetalae.

Betulaceae.

Betula pendula Roth (Gemeine Birke). „Weißbuachn“, auch „Besenbuachn“. Einzeln oder gruppenw., zerstreut.

B. pubescens Ehrh. (Moor-Birke). Uebergangsmoor bei Moor I und Flachmoore nördlich des Sees.

Corylus avellana L. (Gemeiner Haselstrauch). Sehr häufig in Hainen, an Bachufern, in den die Straßen begleitenden Hecken usw. Ortschaft Haslau. Siedlung Haslach.

(*C. a.* var. *oblonga* Anderss. Früchte in den Pfahlbauten von Mondsee, Sammlung M.).

Carpinus betulus L. (Gemeine Hainbuche). „Hoabuachn“. Verbr.

Alnus glutinosa (L.), Gärtn. (Schwarz-Erle). Sehr verbr. längs der Bäche, am See. „Irlholz“ o. „Irlasholz“ für Holzschuhe. Erlen werden geschnaitelt und die Zweige zum Selchen verwendet.

A. incana (L.), Mnch. (Grau-Erle). Sehr verbr., bes. dort, wo das Moränengeschiebe durch Bäche stark aufgerissen ist. Häufiges Auswachsen der Fruchtschuppen durch *Taphrina alni incanae*. (Pilz).

Fagaceae.

Fagus silvatica L. (Gemeine Rot-Buche). Siehe Wald. „Büahas“ Holz für Brennzwecke, Wagnerarbeiten, zum Flachsbrecheln usw.

Quercus robur L. (Stiel-Eiche). Wesentlicher Faktor der Mischwälder. Die Bauern konstatieren das Vorkommen zweier Eichenarten, von denen sie die eine als „Schwarzoachn“ bezeichnen; ihr Holz wird beim Anschneiden dunkel. Wahrscheinlich ist die „Schwarzoachn“ nur eine Standortsform von *Qu. r.* mit größerem Gerbsäuregehalt. Holz von *Qu. r.* für „Toalisäuln“ (Teilungssäulen für Brunnenwasser). Früchte in den Pfahlbauten von Mondsee (S. M.).

(*Qu. sessiliflora* Salisb., Winter-E., fehlt.)

Juglandaceae.

Juglans regia L. (Gem. Nußbaum). Oft kultiviert in der Nähe von Gehöften und an Straßen. (Schon v. altersher.) Siedlung „Nußbaumer“.

(*J. nigra* L., Schwarzfrüchtiger N., fehlt.)

Salicaceae.

- Salix alba* L. (Silber-Weide). Nordwestufer des Sees. Verträgt große Nässe.
S. pupurea L. (Purpur-Weide). Sehr zerstreut in den niederen Lagen. Liebt trockenere, kalkreiche Standorte.
S. incana Schrk. (Ufer-Weide). Ziemlich verbr. an Bächen. Bevorzugt Kalk.
S. viminalis L. (Echte Korb-Weide). Verbr. an Bachufern, doch vielfach angepflanzt.
S. repens L. (Moor-Weide). Flachmoore nördl. des Sees.
S. cinerea L. (Grau-Weide). Sehr verbr. längs der Gräben und an den Waldrändern.
S. caprea L. (Sahl-Weide). Sehr verbr. „Palmmudl“ für Palmbuschen.
S. daphnoides Vill. (Seidelbast-Weide). Zerstreut an Bachufern. Kalk vorziehend.
S. aurita L. (Ohr-Weide). Ziemlich verbr. an Gräben, mäßig die Höhen ansteigend. Bevorzugt kalkfreien Boden. „Wildkatzen“: versch. Weidenarten.
 (S. *nigricans* Sm., Schwärzliche W., fehlt. Übersehen?).
Populus canescens Sm. (Weißpappel × Zitterp.). Selten in vorgelagerten Waldstellen, O. R.
P. tremula L. (Zitter-Pappel). „s' fibrig Lauba“, „Ogspolten“. Sehr verbreitet. Vorgebiet der Wälder, in Hainen, an Bächen. (Siedlung „Agspalter“ westl. von Sommerholz.)
P. balsamifera L. (Balsam-Pappel). Straße Unterschwand-Zell; durch Wurzelbrut wuchernd; sehr selten.
P. italica Mnch. (Pyramiden-Pappel). Straße beim Langwallner, dort auch gegen den See hin gepflanzt. Äußerst kümmerlich, moosbewachsen. (Leucodon sciuroides.) Gegend für diesen Baum scheinbar nicht geeignet.

Ulmaceae.

- Ulmus campestris* L. (Feld-Ulme). Ziemlich verbr. in Bachnähe. Steigt an den östl. H. bis in Waldnähe, doch nur vereinzelt; nicht so häufig wie in ähnlichen Gegenden, weil wärmebedürftig.

Cannabaceae.

- Humulus lupulus* L. (Gemeiner Hopfen). Sehr zerstr. Bevorzugt feuchte Gebüsche. N. Angabe mancher Bauern Blüte früher als Hefeersatz.
Cannabis sativa L. (Gemeiner Hanf); männlicher Hanf: „Baschtrich“. Wird in großen Streifen (beste Ackerstelle) gebaut. Bearbeitung des Hanfes ähnlich wie die des Leines. „Rötzen“ (Rösten) nur durch Hitze.

Urticaceae.

- Urtica dioica* L. (Gemeine Brennessel). Sehr verbr. Nähe menschlicher Siedlungen bevorzugend.
 (U. *urens* L., Kleine B., fehlt.)

Loranthaceae.

- Viscum album* L. (Gemeine Mistel). „Nestla“. Verbr. auf „daligen“ (alterskranken) Apfelbäumen.
V. abietis (Wiesb.) Fritsch, (Tannen-M.). Sehr zerstr. auf „daligen“ Tannen.

Aristolochiaceae.

Asarum europaeum L. (Europäische Haselwurz). „Haselmusch“. Sehr verbr.; wichtiger Faktor im Niederwuchse des Mischwaldes; geht hie und da auf die Wiese. Verwendung: zerriebene Wurzel kommt in nasse Tücher, Mittel gegen Kopfschmerz. Bevorzugt kalkhaltigere Böden.

Polygonaceae.

- Rumex obtusifolius* L. (Wiesen-Ampfer). „Strupfen“. „Alts Roß“. La. Verbr., feuchtigkeits- und düngerliebend. Querlegen auf ausgefahrene Wege.
- R. conglomeratus* Murray (Geknäuelter A.). Moor III. Wiesen nordwärts von Harpoint. Zieml. selten.
- R. sanguineus* L. (Hain-A.). Zerstr. an quelligen Stellen, im Gebüsche in Waldnähe.
- R. crispus* L. (Krauser A.). Verbr. auf Sumpfwiesen, bes. in der Nähe von Zell.
- R. acetosa* L. (Wilder Sauerampfer). Sehr verbreitetes Unkraut. Feuchtigkeitsliebend. Wird als „Himmelsbrot“ von den Kindern gegessen.
- Polygonum aviculare* L. (Vogel-Knöterich). Sehr verbreitet auf Wegrändern in Hausnähe.
- P. bistorta* L. (Natterwurz). Verbreitet in nassen Wiesen, bes. auf den östl. Hängen vom See bis an die Waldgrenze (Harpoint). „Naternzungen“ oder auch hie und da „Hirschzungen“. Sehr unbeliebt wegen der gegen den Sommer zu verdorrenden, das Heu verderbenden Blätter. Findet sich hier am häufigsten unter der von He. angegebenen Grenze der Hauptverbreitung. (He.: 800–1900 m.) Bienenpflanze.
- P. amphibium* L. (Wasser-Knöterich), var. *aquaticum* Leyss. Verbr. im See. Bei sinkendem Wasserspiegel hie und da die Landform.
- P. lapathifolium* L., subsp. *verum*, var. normale Schuster (Ampferblättriger K.). „Riaderer“. Sehr verbreitetes Ackerunkraut. Kümmerformen auf dem Bahndamm.
- P. persicaria* L. (Floh-K.). Von D. für das u. G. als subsp. *angustifolium* angegeben. Zerstreut. Sumpfwiesen nördlich des Sees (Wasserläufe) in Gesellschaft von *P. hydropiper*.
- P. hydropiper* L. (Wasserpfeffer). Ziemlich selten, nördl. des Sees.
- P. minus* Huds. (Kleiner K.). Ziemlich selten in Leinfeldern, sonst häufiger.
- P. mite* Schrank (Milder K.). Sehr zerstreut an Gräben nord- und südwärts des Sees.
- Fagopyrum convolvulus* (L.) H. Gross (Kleine Buchwinde). Zerstreut an ungepflügten Vorgartenrändern.
- F. dumetorum* (L.) Schreb. (Große B.). Sehr selten, bei Hi. auch für die Nachbargebiete nicht angeführt. (Sonst Pflanze der Ebene.) Feuchte Gebüsche.
- Polygonum cuspidatum* Sieb. (Japanischer Knöterich). Bei Bauernhäusern westwärts des Sees; wahrscheinlich von Mondsee her, dort zerstreut im Friedhofe.

Chenopodiaceae.

- Beta vulgaris* L. (Gebaute Runkelrübe). „Rana“, „Gunkel“, „Doarschn“; rote Rüben für den Salat. (Salatrübe.)
- Chenopodium bonus Henricus* L. (Guter Heinrich). Ziemlich selten in Haslau, gruppenweise. Seit 1927 Dorfplatz von Zell. Seit 1929 in Unterschwand.
- Ch. polyspermum* L. (Garten-Gänsefuß). Sehr seltenes Unkraut in Wurzgärten.

Ch. album L. (Gemeiner G.). Verbreitetes Unkraut. Zahlreiche Formen und Übergänge.

Manche *Chenopodium*arten mögen noch im Gebiete als vorübergehend, nie aber bestandsbildend, gefunden werden. Das überraschende Auftauchen und Wiederverschwinden ist ja für manche *Chenopodium*arten geradezu charakteristisch. So fand der Verfasser keine *Atriplex*arten. Übersehen?

Spinacia oleracea L. (Echter Spinat). Den Bauern i. a. unbekannt und doch von den Mondseer Sommerfrischlern gut bezahlt. (Siehe Konservatismus!) In Zell in einigen Vorgärten.

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago L. (Gemeine Kornrade). „Radn“. Verbreitet in Getreidefeldern.

Silene vulgaris (Mnch.) Garcke (Aufgeblasenes Leimkraut). „Schnalzbleaml“. Ziemlich verbreitet auf Wiesen in niederen und zum Teile in mittleren Lagen. Gegen Oberhofen zu auffallend häufiger, wahrscheinlich von Norden her eingewandert.

(*S. nutans* L., Nickendes L., im eigentlichen u. G. fehlend, doch von Neumarkt her bis an den Sommerholzer Sattel kommend.)

Lychnis flos cuculi L. (Kuckucks-Lichtnelke). Ziemlich verbreitet in feuchten Wiesen.

L. coronaria (L.) Dsr. (Kranz-Lichtnelke). Selten in Bauerngärten.

Melandryum silvestre (Sch.) Röhl. (Rotes Marienröschen). Ziemlich verbreitet von der Beckensohle bis zu den höchsten Gipfeln, besonders in Breitblattw. Zottige Form in der Nähe von Moor III. Zwitterformen auf den Wiesen bei Neuhäusel. (Oft, wie He. erwähnt, Fruchtknoten nur rudimentär.)

M. album Garcke (Weißes M.). Fehlt ursprünglich. 1928 auf einem Kleeacker des Irrsberges; wahrscheinlich mit fremdem Kleesamen gekommen. He.: „Nach Scharfetter — brieflich — ist um Salzburg ein strichweises Wechseln der beiden *Melandryum*arten zu beobachten.“

(*Cucubalus baccifer* L., Taubenkropf, nicht gefunden. Allerdings von Pf. S. für Oberhofen als selten genannt. Sonst für die Alpentäler und für Salzburg überhaupt als fehlend angegeben.)

Dianthus caryophyllus L. (Garten-Nelke). Kultiviert in Vorgärten und Wurzgärten.

Stellaria nemorum L. subsp. *montana* Murbeck (Wald-Sternmiere). Sehr selten an feuchten Waldstellen der westl. H.

St. media L. (Gemeiner Hühnerdarm). „Zeiserlkraut“. Nähe menschlicher Wohnungen, sehr zerstreut.

St. graminea L. (Grasartige Sternmiere). Leitpflanze.⁵⁶⁾ Vorliebe für kieselhaltige Böden. Verbr.

St. uliginosa Murr. (Schlamm-St.). Zerstreut an Bächen, quelligen Stellen.

Cerastium caespitosum Gilib. (Gemeines Hornkraut). Ziemlich verbreitet in den Wiesen.

⁵⁶⁾ Unter „Leitpflanzen“ versteht der Verfasser für das u. G. charakteristische Pflanzen, die in mancherlei Assoziationen vom Beckengrunde bis zu den Gipfeln, meist in auffallender Menge, vorkommen; also nicht „Leitpflanzen“ der Pflanzengesellschaften im Sinne Gradmanns u. Schröters. Rübel, Untersuchungsmethoden S. 230.

Sagina procumbens L. (Gemeines Mastkraut). Selten auf feuchten Brachen.
Arenaria serpyllifolia L. (Gemeines Sandkraut). Selten auf Brachen, in Äckern.
Spergula arvensis L. var. *vulgaris* Boenningh. (Acker-Spark). Selten auf Kartoffeläckern.

Scleranthus annuus L. (Einj. Knäuel). Ziemlich verbreitet in Haferfeldern, fast nur auf ganz kalkfreiem Boden.

Berberidaceae.

Berberis vulgaris L. (Gemeiner Sauerdorn). „Boaßlbeer“. Ziemlich verbreitet an Waldrändern, in Gebüsch usw. Gerne auf Kalkboden. Die Schädlichkeit des Strauches als Überträger des schwarzen Getreiderostes (*Puccinia graminis*) unbekannt.

Ranunculaceae.

Caltha palustris L. (Sumpf-Dotterblume). „Kuahbleaml, Schmalzbleaml“. Nur *C. p.* wird als „Schmalzbleaml“ bezeichnet, während der Wiener alle gelbblühenden Hahnenfußarten, vorzüglich *R. acer*, „Schmalzblumen“ nennt. Verbreitet in Gräben und Tümpeln. Zweite Blüte Ende August.

Trollius europaeus L. (Eur. Trollblume). Der *f. typica* im allgemeinen entsprechend, doch fast alle Blütenblätter gezähnt. Sehr verbreitet auf feuchten Wiesen. Zweite Blüte (häufig) Ende August. Bodenvag.

Helleborus viridis L. (Grüne Nieswurz). „Schelmkraut“. Früher (nach Hi.) von Mondsee die östl. H. bis Guggenberg „nicht sparsam“, heute frei fehlend, in die Wurzgärten verpflanzt. Die Wurzeln werden oft jungen Schweinen, und zwar entweder getrocknet oder frisch, mittelst eines Federkiesels durch die Ohrmuscheln, gegen eine vermeintliche Krankheit, den „Schelm“, gezogen.

(*H. niger* L., Schwarze Nieswurz, fehlt. Tritt sofort beim Beginne des Kalkgebietes massenhaft auf.)

Actaea spicata L. (Christophskraut). Sehr zerstr. im Gschwandner Hölzl und auf dem Kolomann. Schattige, feuchte Standorte.

Aquilegia vulgaris L. (Gemeiner Akelei). Sehr zerstr.: 1. Ramsauerbach, nahe der Einmündung. 2. H. östl. des Gschwander Hölzls. Scharenweise.

Delphinium ajacis L. (Garten-Rittersporn). In Gärten.

(*D. consolida* L., Feld-R., fehlt.)

Aconitum napellus L. (Eisenhut). Nur ein auffallender Fundort: scharenweise in der Umgebung des Neuhäusler Moores. Nächstes Vorkommen erst südl. i. Kalkgebirge bei Wartenfels.

A. vulparia Rchb. (Wolfs-Eisenhut). Nur ein Vorkommen: längs der Ache von der Nähe Mondsees bis zur Erlachmühle (Helenenweg). Gruppenw.

A. Stoerckianum Rchb. (Garten-Eisenhut). Vorgärten und auch vereinzelt in Wurzgärten.

Clematis vitalba L. (Gemeine Waldrebe). „Lian“ zum Besenbinden. Zerstr. in Gebüsch, lichterem Wäldern usw. Als Ziegenfutter — wie in anderen armen Gegenden — nicht verwendet.

Anemone nemorosa L. (Buschwindröschen). Sehr verbr. Wiesenpflanze. An feuchten Stellen. Vorherrschen der Formen mit außen rötlich-violetterm Perianth.⁵⁷⁾ „Kroahaxl“.

⁵⁷⁾ Das starke Hervortreten anthokyanreicher Formen ist außer bei *A. n.* noch bei folgenden Pflanzen im u. G. besonders auffallend: *Bellis peren-*

- (*A. ranunculoides* L., Gelbes Windröschen, fehlt. Im benachbarten Kalkgebiete nach Hi. gemein.)
- Ranunculus flammula* L. subsp. flamm. Schinz et Keller var. serratus D. C. (Brennender Hahnenfuß). Genannte Form die häufigste, doch zeigt R. f. die mannigfaltigsten Abänderungen. Moor II zeigt besonders auffallende Varietäten. Äußerst verbr. in den Rinnsalen der Wiesen. (*R. sardous* Cr., Rauhaariger H., nach Hi. in der Mondseer Gegend.)
- R. lingua* L. var. typicus Beck (Großer Hahnenfuß). Verbr. in den breiteren Wassergräben nordw. des Sees.
- R. repens* L. (Kriechender Hahnenfuß). Äußerst verbr. in den Wassergräben und auf den Feldern. „Heanadarm“. Verwendung gegen Wassersucht.
- R. nemorosus* D. C. (Wald-Hahnenfuß). Zerstr. von der Beckensohle bis zu den Gipfeln beiderseits. Schattige, hie und da sumpfige Stellen.
- R. lanuginosus* L. (Wolliger H.). Sehr verbr. infolge der Vorliebe für feuchte, schattige Orte von den Breitblattwiesen bis hinauf und hinein in die Bergwälder. Vorliebe für etwas kalkhaltige Böden.
- R. acer* L. (Scharfer H.). „Teufelskraut“. Zerstreut in vielen Wiesen.
- R. aconitifolius* L. (Eisenhutblättriger H.). 1. Ziemlich selten an quelligen Stellen nordw. der Zeller Badeanlage. 2. Sehr verbr. in den Gräben nördl. des Sees. Feuchte Standorte mit Kalk bevorzugend.
- (*R. aquatilis* L., Wasser-H., nach Hi. in der Mondseer Gegend.)
- R. circinatus* Sibth. (Ausgespreizter Hahnenfuß). Verbr. im Südende des Sees.
- R. ficaria* L. (Gemeine Feigwurz). Zerstr. Wiesen zwischen Seewirt und See.
- Paeonia* off. L. (Pfingstrose). In Gärten.

Nymphaeaceae.

- Nuphar luteum* (L.) Sm. (Gelbe Nixenblume). Ziemlich verbr. in verschiedenen Seeteilen. Die Wasserblätter bilden ausgedehnte submerse „Salatwiesen“.
- Castalia alba* (L.) Wood = *Nymphaea candida* Presl = *Castalia biradiata* Hayek (Gemeine Seerose). Nach der von Schuster getroffenen Einteilung var. sphaeroides subv. patula f. olivacea. Verbr. 1. See. 2. Wandert in den kleinen Gräben der Moorwiesen nördl. des Sees weit nach Norden.
- (*C. a. f. minor* nach Hi. in Mondsee.)

Ceratophyllaceae.

- Ceratophyllum submersum* L. (Glattes Hornkraut). Zerstr. in der Ache in der Nähe von Kasten. S. F. 1923.
- (*C. demersum* L., Rauhes H., Trumersee.)

Papaveraceae.

- Chelidonium maius* L. (Gemeines Schöllkraut). Zerstr. in Hausnähe.
- Papaver rhoeas* L. (Klatsch-Mohn). „Kornrose“. Zerstr., Ackerunkraut.

nis, *Achillea millefolium*, *Chaerophyllum cicutaria*, *Corydalis cava* (Fehlen weißer Blüten im u. G.) und *Dactylis glomerata*. Die anthokyanreichen Formen finden sich vorherrschend an sehr feuchten Stellen oder in höheren, rauheren Lagen. (Anthokyan = Blütenblau.)

- P. somniferum* L. (Garten-Mohn). In Wurzgärten als Zierpflanze; Absud als Einschläferungsmittel für Kinder.
Corydalis cava (L.) Schw. et K. (Hohlwurz). Nur violett blühend, selten etwas bleicher. Äußerst verbr. in den Breithblattwiesen.
Dicentra spectabilis (L.) D. C. (Herzblume). „Frauenherzerl“, „Marienherzerl“. Beliebt in Wurzgärten.

Cruciferae.

- Lepidium sativum* L. (Garten-Kresse). In Gärten.
 (L. *draba* L., L. *campestre* (L.) R. Br. u. L. *ruderales* L., Graufäulmige K., Feld-K. und Stinkende K., fehlen!)
Iberis umbellata L. und I. *amara* L. (Bauernsenf). Sehr zerstr. in Wurzgärten. Friedhof.
 (Thlaspi *arvense* L., Feld-Täschelkraut, Neumärkter Gegend. Hi.)
 (T. *alliaceum* L., Lauch-T., Straßwalchen, Talgau. Hi.)
 (Alliaria off. Andr., Gem. Lauchkraut, fehlt!)
Sisymbrium officinale Scop. (Gebräuchliche Rauke). Selten in niederen Lagen.
Hirschfeldia gallica Fritsch (Rempe). Sehr selten auf dem Bahndamm, truppw.
Brassica oleracea L. (Gemüsekohl). Kraut wird gebaut, Kohl sehr wenig, Karfiol in Vorgärten von Oberhofen, Sprossenkohl und „Kohlrabi“ als Gemüse zieml. unbekannt.
B. napus L. em. Metzger (Repskohl). Zerstr. Ackerunkraut. Gegen B. *rapa* oft sehr schwer abzugrenzen.
B. rapa L. (Rübenkohl). „Düln“, „Wilde Ruabn“, „Zeller Bleaml“, „Sommerholzer Bleaml“, äußerst verbr. Kulturform „Feldruabn“.
 (B. *nigra* Koch, Schwarzer Senf, fehlt, möglicherweise ephem.)
Sinapis arvensis L. (Acker-Senf). Selten, seit 1927 in den Äckern etwas häufiger werdend.
 (S. *alba* L., Weißer Senf, fehlt.)
Raphanus raphanistrum L. (Gemeiner Hederich). „Hawableaml“ (Haferblümchen), „Hederich“. Häufiges Ackerunkraut. Lehm- und Sandboden.
R. sativus L. (Garten-Rettich). Häufig gepflanzt.
Barbarea vulgaris R. Br. (Gemeines Barbarakraut). Zerstr. in Äckern von Norden her.
Armoracia lapathifolia Gilib. (Kren). In Wurzgärten und verwildert in Hausnähe.
Cardaminum nasturtium (L.) Mnh. (Gemeine Brunnenkresse). „Wilde Kresse“, „Brunnenkress“. Zerstr. in langsam fließenden Wässern.
Dentaria bulbifera L. (Zwiebeltragende Zahnwurz). Hasenkopf, vor dem Moore III, Helenenweg. Ziemlich zerstr. Bevorzugt kalkreiche Unterlage.
D. enneaphyllos (L.) Cr. (Neunblättrige Z.). Ziemlich verbr. auf beiden Hängen. Vorliebe für Kalk. Rhizom: „Saunigiwurz“, Heilmittel.
Cardamine trifolia L. (Kleeblättriges Schaumkraut). Äußerst verbr. auf beiden H. (Feuchtigkeit- und schattentl., kalkigen B. vorz.)
C. flexuosa Withering, f. *umbrosa* Grenier et Godron (Wald-Sch.). Quellige Waldst. Selten. Auf kalkigem B. verschwindend.
C. pratensis L. (Wiesen-Sch.). Wasserläufe. Bodenvag. Verbr.
C. amara L. (Bitteres Sch.). Bäche in Zell. Selten.
C. impatiens L. (Spring-Sch.). Zerstr. (Harpoint, Freudental.)
C. hirsuta L. (Haariges Sch.). Zerstreut auf den westl. H.
Lunaria annua L. (Zweij. Mondviole). Wurzgärten.

(*L. rediviva* L., Ausdauernde M., erst im südl. Kalkgebiet.)

Capsella bursa pastoris (L.) Med. (Gem. Hirtentäschel). Sehr verbr. Ackerunkraut.

Camelina alyssum (Mill.) Thell. (Gezählter Leindotter). „Hoardolden“. Verbr., doch auf Leinäcker beschränkt.

Draba verna L. (Hungerblümchen). Sehr zerstr. auf Brachäckern. (Ostern 1926.)

Arabis hirsuta Scop. (Rauhhaarige Gänsekresse). Nur am 20. Mai 1926 ein Exemplar aus der Zeller Gegend von Herrn S. B. erhalten.

(Die kalkliebenden Arabisarten fehlen fast vollständig.)

Erysimum cheiri Cr. (Goldlack). Gärten.

Hesperis matronalis L. (Garten-Nachtviole), var. *integrifolia*. Wurzgärten gegen Mondsee zu, dort auch verwildert.

Bunias erucago L. (Zackenschötchen). „Feldratz“, „s Viertel vom Kloft“. Verbreitetes Ackerunkraut.

(*Alyssum alyssoides* L., Kelchfrüchtiges Steinkraut, erst jenseits des Sommerholzer Sattels in Neumarkt.)

Resedaceae.

Reseda odorata L. (Garten-Wau). Liebt in Wurzgärten.

R. lutea L. (Gelber Wau). Erst seit 1927 sehr selten auf dem Bahndamm.

Crassulaceae.

Sedum boloniense Lois. (Milder Mauerpfeffer). Bahnnähe 1926. Äußerst selten.

(*S. acre* L., Scharfer M., fehlt.)

S. purpureum (L.) Schult. (Rote Fetthenne). „Foaste Kūah“. Ziemlich verbreitet auf den östl. H., dort gruppenw. Selten westl. H.

Sempervivum tectorum L. (Dach-Hauswurz). „Hausapfel“. Allg. auf Rauchfängen der Bauernhäuser. (Vermeintlicher Hausschutz.) Hausmittel gegen verschiedene Krankheiten.

Saxifragaceae.

Chrysosplenium alternifolium L. (Wechselbl. Milzkraut). Verbr., bes. auf den Hauswiesen in Seenähe.

(Die Saxifragaarten fehlen; jenseits des Mondsees *S. rotundif.* sehr häufig.)

Parnassia palustris L. (Studentenröschen). „Groamatbleaml“. Sehr verbr. in Wiesen u. benachb. Assoziationen. Sehr feuchtigkeitsl.

Ribes grossularia L. (Stachelbeere). Wurzgärten. „Oatabozn“.

R. vulgare Lam. (Gem. Johannisb.). Zell 28 Bauernh., Oberhofen verbreitet.

R. nigrum L. (Schwarze Johannisbeere). Im Zeller Schulgarten. Verwendung gegen Innenleiden; feuchtigkeitsliebend.

Philadelphus coronarius L. (Pfeifenstrauch). Sehr selten in Vorgärten von Zell.

Rosaceae.

Aruncus silvester Kostel. (Geißbart). Verbreitet an beiden H. Liebt luftfeuchte, frische, schattige, humöse Standorte mit Silikatboden.

Pirus piraster L. (Holzbirne). Nach O. R. nirgends ursprünglich. Birnen in mannigfachen Spielarten vom Beckengrunde bis zu den höchst gelegenen Häusern; wenig Edelsorten, mit Ausnahme des Spalierobstes

- bei manchen Häusern. (Für baltische Gegenden wird im allgemeinen Minderwertigkeit des Obstes angegeben.)
 (Cydonia oblonga Mill., Quitte, fehlt; in Mondsee kultiviert.)
Sorbus aucuparia L. (Vogelbeerbaum). Verbr., bildet neben *Alnus incana*, *A. glutinosa*, *Acer pseudopl.* u. *Fraxinus exc.* einen der wichtigsten Hauptsiedler der östlichen Quertäler. Uferpflanze. Randgebiet des Moores I. Bodenvag.
S. domestica L. (Speierling). Sehr selten im „Hag“ bei Unterschwand. Zweifellos, weil ganz vereinzelt, im z. T. künstl. gesetzten Hage nur zufällig; sonst nur auf kalkreicher Unterlage.
S. aria (L.) Cr. (Mehlbeerbaum). Sehr selten an trockeneren Stellen der Osthänge. (In gemischten Buschbeständen.)
(S. torminalis Cr., Elsbeerbaum, fehlt.)
Crataegus oxyacantha L. (Gemeiner Weißdorn). Zerstr. in Gebüsch und Vorhölzern. (Nordwärts von Harpoint.) Bodenvag.
Cr. monogyna Jacqu. (Einsamiger W.). Zerstr. auf den östl. und westl. H., auf letzteren nur auf schwerem, kalkreichem Lehmboden gefunden. (Auf Kalk am besten gedeihend.)
 (Amelanchier ovalis Med., Felsenbirne, erst südl. von Mondsee.)
Malus silvestris (L.) Mill. (Holzapfel). Zerstr. auf den östl. H. Holzapfelabsud gegen Wassersucht. Ursprünglich: gedörrte Apfelschnitten in den Mondseer Pfahlbauten. (S. M.)
M. pumila Mill. (Gemeiner Apfelbaum). Der Apfelbaum wird wie der Birnbaum in mancherlei, meist recht gewöhnlichen Arten von der Beckensohle bis zu den höchsten Siedlungen ohne besondere Beobachtung einer rationellen Obstkultur gezogen. Neben dem Birnbaum für die „Most“-gewinnung wichtig. Der „Most“ des u. G. ist größtenteils minderwertig.⁵⁸⁾
Rubus saxatilis L. (Felsenbeere). Sehr selten auf dem Kolomann (Gipfelnähe). Bodenvag, nur fakultativ kalkliebend, wofür schon die Ausdehnung von den Kalkalpen über das Flyschgebiet bis zur Donau spricht.
R. idaeus L. (Himbeere). Äußerst verbr. auf beiden H. „Kindlbeer“ werden von der ärmeren Bevölkerung (Ablieferung an Sammelstellen) in riesigen Mengen gepflückt. Ausgiebige endozoische Verbreitung.
R. caesius L. (Bereifte Brombeere). Zerstr. in verschiedenst geformten Gebüsch; Gschwander Hölzl. Die Gipfel erreichend.
R. fruticosus L. (Brombeere). Mannigfaltigste subsp. Sehr verbreitet im Bachgestrüpp, an Waldrändern, ins Waldinnere gehend, besonders zwischen *R. idaeus*. „Broman“.
R. hirtus W. K. (Rauhstengelige B.). Zerstr. Gschwander Hölzl, Gebüsche beim Zellerbach. Ausgesprochen feuchtigkeitsl.

⁵⁸⁾ Im Beckengrunde und in seiner Nähe ist die Obstbaumzucht noch halbwegs rentabel, man kann hier unter normalen Umständen in der Mehrzahl der Jahre auch auf eine mittelmäßige Ernte rechnen, in den höher gelegenen Teilen liegen die Verhältnisse naturgemäß ungünstiger. Die Reifezeit charakterisiert hübsch ein alter Volksspruch: „Der Lenzl (10. August) tuats salzn, der Bartl (24. August) tuats schmalzn, der Hiasl (21. September) gibt den Gschmack und der Michl (29. September) trocknet 's ab.“ — Bestimmte Sorten werden von einem Krebs (*Nectria*) befallen; die Rindenwucherungen werden mittelst siedenden Wassers abgelöst und aus ihnen Bilderrahmen, Pfeifen usw. geschnitzt.

- Potentilla palustris* (L.) Scop. = *Comarum palustre* L. (Blutauge). Herdenweise in den Sumpfwiesen nördl. des Sees, in Unterschwand und vor dem Moore I. Nur auf kalkfreier Unterlage.
- P. erecta* (L.) Hampe (Blutwurz). Äußerst verbr., Leitpflanze. Gewöhnlich niederliegend, im Hain von Unterschwand aufrecht, 20—30 cm hoch. Auf den westl. H., seltener auf den östl. H., Exemplare mit 5 Blumenblättern. In der Nähe des Attergaues (fränkische Siedlungen!) „Tuifelsabbiß“.⁵⁹⁾ Bodenvag, feuchte Standorte bevorzugend, doch im allgemeinen eine typisch euryözische Pflanze. (Sich verschiedenen Standorten anpassend.)
- P. reptans* L. (Kriechendes Fingerkraut). Sumpfwiesen nördl. des Sees, Wiesen bei Unterschwand. Verbr.
- P. anserina* L. (Gänse-F.). Oberhofen: auf der Straße und auf den Wegen zum Orte. Zell: Kirchenplatz. Zerstr.
- Fragaria vesca* L. (Wald-Erdbeere). Verbr. Bodenvag, herdenweise. Beckensohle bis Gipfel. (Andere *Fragaria*-arten möglicherweise übersehen.)
- Geum rivale* L. (Bach-Nelkenwurz). Zerstr. Quergräben der östl. H. und Badnähe. Bevorzugt kalkreichere Böden, nur an sehr feuchten Standorten.
- G. urbanum* L. (Echte N.). Verbreitet in lichten Gehölzen, in Aueständen, gerne in Hausnähe. (Epizoochorie.) Bodenvag; an Orten mit mittlerer Feuchtigkeit und leichter Beschattung am häufigsten.
- G. Magellanicum* Comm., Zierstäude in Bauerngärten. „Staudenerdbeere“.
- Agrimonia eupatoria* L. (Odermennig). Nur zwei Fundorte, dort herdenweise: 1. Sträßchen von Mondsee aufwärts gegen den Lackerberg. 2. Sträßchen oberhalb des Wolfbauern gegen Haslau. Kalkl.
- Sanguisorba officinalis* L. (Gem. Wiesenknopf). Sehr verbreitete Zierde der feuchten Wiesen; im u. G. ausgesprochen feuchtigkeitsliebend. „Braunellen“ La. Verwendung der braunen Blütenköpfe gegen Durchfall.
- S. minor* Scop. (Grüner W.). Sehr selten auf Wiesen von Oberhofen, liebt kalkhaltigen Boden.
- Alchemilla vulgaris* L. (Gem. Frauenmantel). „s' Manterl“. La. Sehr verbr. In Oberhofen für Fronleichnamskränze. Frischen, feuchten Boden bevorzugend.
- Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. (Mädisüß). „Bei'kraut“. (Bienenkraut). Äußerst verbr., meist herdenw. an feuchteren Stellen.
- (*F. hexapetala* Gilib., Knolliges M., von der Neumarkter Gegend gegen die westl. Hügelzüge d. u. G. D.)
- Rosa arvensis* Hudson (Feld-Rose). Verbr.; etwas kalkhold.
- R. canina* L. (Hecken-R.). Verbr. Spezialisierung der Wildrosen im u. G. bleibt offen. Früchte von R. c. Pfahlbauten v. M. (S. M.) Fr.: „Achkitzl“.
- (*R. alpina* = *R. pendulina* L., Hängefrüchtige R., südl. v. Mondsee.) Rosenzucht in Oberhofen und Zell sehr gering.
- (*Cotoneaster tomentosa* Lindl., Filzige Steinmispel, Hügel bei Mondsee. Hi.)
- Prunus avium* L. (Kirschbaum). Ziemlich verbr., wild. Eingestreut in die Mischwälder der östl. H. o. im Vorgebiete dieser. Veredelt in Hausnähe. Steigt 750—850 m hoch. Holz gerne für die großen Platten der Bauerntische. Holznägel.
- P. padus* L. (Traubenkirsche). „Elexen“. Verbr. auf kalkarmem Boden im Auholze und in feuchteren Teilen der Mischwälder. Holz als Heilm.

⁵⁹⁾ Fränkisch: „Duvelsabbeß“. Marzell H., Ill. Kräuterbuch (1923) S. 469.

- P. cerasus* L. (Weichselbaum). Wild bes. auf den östl. H. Verbr. sind die als Amarellen bekannten Spielarten. S. B.
P. spinosa L. (Schlehdorn). Zerstr. im ganzen Gebiete, meist auf sonnigere H. (Straßennähe), Kalk bevorzugend, beschränkt.
P. persica (L.) Sieb. et Zucc. (Pfirsich). Pfarrhof von Zell. Früchte werden hier niemals reif.
P. armeniaca L. (Aprikose). Spalierobst bei manchen Bauernhäusern.
P. domestica L. (Zwetschkenbaum). Kultiviert oder wild (verwildert) bis zu den Waldrändern. Holz bes. für Messergriffe. Viel Blutlausbefall.
P. insitita L. (Kriechenbaum). In Kultur bei manchen Häusern. Ursprgl.

Leguminosae.

- Genista germanica* L. (Deutscher Ginster). Nach S. gerichtete Wiese auf dem Irrsberge. Waldnähe. (800 m.)
G. tinctoria L. (Färber-G.). Irrsberg wie oben u. fast in gleicher Höhe gegenüber auf dem Koglerberge.
(Cytisus nigricans L., Schwärzlicher G., u. *C. supinus* L., Niedriger G., Neumarkt. Dr. Sauter u. H.)
(Laburnum anagyroides Med., Goldregen, fehlt.)
Ononis spinosa L. (Dornige Hauhechel), subsp. *austriaca* Gams. „Oahakn“. Auf den östl. H. sehr verbr., bes. auf kalkigem Boden.
(O. repens L., Kriechende H., Mondsee, Talgau. Hi.)
Medicago lup. L. (Hopfenklee). Verbr. Verschied. Wiesenassoz. auf trockeneren Böden.
M. sativa L. (Luzerne). Sehr selten. Nach S. B. wahrscheinlich Reste eines versuchten Anbaues.
Melilotus albus Desr. (Weißer Steinklee). Sehr selten. 1. Zellerbach 550 m. 2. Beim Achleitner 650 m.
M. officinalis (L.) Lam. (Gelber Steinklee). Äußerst selten 1929 in Ortsnähe. Verbr. Straßwalchen, Steindorf-Neumarkt.
Trifolium dubium Sibth. (Kleiner Klee). Sehr zerstr.
T. strepens Cr. (Gold-K.). „Stoaklee“. Zerstreut.
T. hybridum L. (Schwedischer K.). Zerstr. Östl. H.
T. repens L. (Weiß-K.). Äußerst häufig. Wiesen mit mittl. Feuchtigkeit.
T. montanum L. (Berg-K.). Ziemlich verbr. Kalkl.
T. incarnatum L. (Inkarnatklee). Hier und da versuchsweise für Gründüngung angebaut.
T. pratense L. (Rot-K.). Sehr verbr. Auch hier ist es, wie He. bemerkt, unmöglich, die einzelnen Rassen nach morphologischen Gesichtspunkten sicher anzugeben. Bunte Mischung herkömmlicher und neu gekaufter Sorten.
T. medium L. subsp. *flexuosum* Aschers. et Graebn., subv. *genuinum* Rouy. (Mittlerer K.). Zerstr. Indifferent in Bezug auf Kalk, nicht zu trockener Boden, in Bachnähe der Mischwälder.
T. spadicum L. (Kastanienbr. K.). Äußerst selten.
Anthyllis vulneraria L., var. *vulg.* Koch, f. *declivium* Aschers. et Graeb. (Wundklee). Ziemlich verbr. in Wiesen.
(Coronilla emerus L., Strauchige Kronenwicke, erst südl. v. Mondsee.)
(Dorycnium germanicum Rouy, Backenklee, südl. Kalkgebiet, St. Gilgen.)
(Coronilla varia L. u. *Onobrychis viciaefolia* Scop., Bunte Kronenwicke und Eparsette, fehlen.)

- Astragalus glycyphyllos* L. (Süßer Tragant). Zerstr. auf beiden H., hier der einzige Vertreter d. Astragalusarten.
 (A. onobrychis L., Langfahner Tr., Neumarkt. Hi.)
Lotus corniculatus L. subsp. eu-corniculatus Asch. et Gräb. var. *arvensis* Ser. f. *genuinus* Posp. (Gem. Hornklee). „Kroahaxl“ (Krähenfuß), „Frauenschuacherl“, „Heanafußl“. Sehr verbr., Kalkboden bevorzugend.
Vicia hirsuta S. F. Gray. „Vogelhuttn“. (Rauhhaarige Wicke). Früchte: „d'kloan Meiserln“. Sehr verbr. Etwas kalkl.
V. tetrasperma Moench, subsp. *eutetrasperma* Briquet var. *leiocarpa* (Vier-samige W.). Zieml. verbr., kalkarmer Boden.
V. cracca L. (Vogel-W.). Verbreitetes Ackerunkraut, auch sonst häufig.
V. sepium L. (Zaun-W.). Zerstr. Ackerränder, Laubgehölze.
V. sativa L. (Futter-W.). Subsp. *obovata* Gaudin, var. *vulgaris* Gren. et Godron f. *cordifolia* Beck. Früher gebaut, zwischen Getreide.
V. faba L. (Saubohne). Gedeiht gut, weil feuchtigkeitsl. Hie und da zwischen Kartoffeln gebaut. Samen werden in Kraut gesotten.
Lathyrus pratensis L. (Wiesen-Platterbse). Var. *genuinus* Ducommun, f. *glabrescens* Beck. Verbr. Meidet die trockeneren Wiesen.
L. tuberosus L. (Knollige P.). Von Seekirchen her östl. des Sommerholzer Sattels.
L. silvester L. (Wald-P.). Var. *oblongus*. Kolomann, Irrsberg, Gommersberg. Bevorzugt südexponierte kalkhaltige Stellen. Zerstreut.
Pisum sativum L. (Garten-Erbse). Vereinzelt gebaut.
P. arvense L. (Feld-Erbse). Wird hie und da unter Hafer gebaut. (Altbayrische Sitte, Grünfutter). Pfahlbauten v. Mondsee (S. M.).
Phaseolus vulg. L. (Gemeine Bohne). Vorgärten.
Robinia pseudacacia L. (Robinie). Selten gepfl. Entwickelt sich nicht bes. gut.

Oxalidaceae.

- Oxalis acetosella* L. (Sauerklee). „Waldklee“. Äußerst verbr. an feuchten Waldstellen. Bodenvag.
O. stricta L. (Steifer S.). Zerstr.: Gartenränder, Friedhof.

Geraniaceae.

- Geranium columbinum* L. (Tauben-Storchschnabel). Zerstreutes Ackerunkraut.
G. dissectum L. (Schlitzblättriger St.). Verbr.
G. palustre L. (Sumpf-St.). 1. Phragmitetum beim Badeplatze. 2. Am Zeller Bache. Verbreiteter in der Irrsdorfer Gegend. Unbedingt feuchte Standorte.
G. pusillum Burm. (Kleiner St.). Äußerst seltener Ephemerit.
G. Robertianum L. (Stinkender St.). In allen Waldgebüsch, äußerst verbr. In Wiesen oft f. *rubicaule* Hornem. Feuchtigkeitsl.
 (G. *phaeum* L., Braunblühender St., südl. von Mondsee u. im Attergau.)

Balsaminaceae.

- Impatiens noli tangere* L. (Gemeines Springkraut). „Tolimetangerl“. La. „Zornhaferl“. Verbr. in feuchten Gebüsch, feuchtem Wald, Bodenvag.
 (I. *parviflora* D. C., Kleinblütiges S., erst in der Salzburger Gegend.)
I. Roylei Walp. (Garten-Spr.). Sehr verbr. in Gärten.

Tropaeolaceae.

- Tropaeolum maius* L. (Kapuzinerkresse). Vorgärten.

Linaceae.

Linum catharticum L. (Purgier-L.). Äußerst verbr. in feuchten und auch in etwas trockeneren Wiesen.

L. usitatissimum L. (Lein). Das „Hoar“ wird nach der Brache oder nach dem „Kleewosn“ im Mai (zu Urbani, 25.) gesetzt. Das u. G. ist eine Leingegend. (Ortschaft „Harpoint“). Das Rösten („Rötzen“) der Leinpflanze geschah bis vor kurzem zumeist im „Bade“, einer stark geheizten eigenen Anlage. Heute tauschen die Bauern den Lein meist gegen fertige Leinwand ein.

Alte Volksbräuche knüpfen sich an den Leinbau. So wird nach dem „Zedeln“ (Auflegen auf die Wiesen) der Spruch gesagt:

„Hoar, i segn' di nieder, in vier Wochen komm i wieda;

Laß di riebln, laß di reibn, laß di spinna wia a Seidn.“

Dann werden aus Flachsbündeln drei Kreuze gelegt.

Aceraceae.

Acer pseudoplatanus L. (Berg-Ahorn). „Ahurn“. Formen mit helleren Blättern und großen Früchten und solche mit dunkleren Blättern und kleineren Früchten. Sehr verbr., bes. auf den östl. H.; entweder in die Mischwälder eingestreut oder, vor allem längs der Quertäler, kleinere Bestände bildend. Zweifellos ursprünglich. Holz f. Tischpl., z. Wagenbau. (*A. campestre* u. *A. platanoides* L., Feld-A. u. Spitz-A., fehlen.)

Hippocastanaceae.

Aesculus hippocastanum L. (Roßkastanie). Dorfplatz in Oberhofen, Gärten der Gasthöfe von Oberhofen und Zell. Kastanienallee von Zell aus südwärts 1902 gepflanzt. Leider werden die Roßkastanien vielfach wegen ihres raschen Wachstums der einheimischen Linde vorgezogen.

Polygalaceae.

Polygala amarella Cr. (Sumpf-Kreuzblume). Verbreitet auf beiden H., besonders zwischen 600 und 700 m. Feuchter Boden.

P. vulgaris L. (Gemeine K.). Ziemlich verbreitet auf trockeneren Standorten. Liebt kalkärmere Unterlagen.

(*P. maior* Jacqu., Große K., scheint zu fehlen.)

Euphorbiaceae.

Mercurialis perennis L. (Ausdauerndes Bingelkraut). Äußerst verbreitet und in schattigen Wäldern oft ausgedehnte Herden bildend. Mäßig feuchter bis feuchter Boden.

(*M. annua* L., Einjähriges B., fehlt.)

Euphorbia dulcis L. (Süße Wolfsmilch). Zerstreut, wenige Fundorte: 1. Hänge des Irrsberges. 2. Mühlgraben auf dem Koglerberg. Liebt schattige und luftfeuchte Laubbestände, nach He. gesellig auf humösem Kalk- und Urgestein.

E. stricta L. (Steife W.). Zerstreut. Nur zwei geschlossene Fundorte: nordöstlich und südwestlich des Sees, Sumpfstellen im Austrocknen. Wahrscheinlich von Süden her eingewandert.

E. helioscopia L. (Sonnenwendige W.). Verbreitet nordöstlich von Zell. (Kartoffeläcker.)

- E. verrucosa* L. (Warzige W.). Selten; in ungepflegten Vorgärten.
E. amygdaloides L. (Mandelblättrige W.). Selten. Isolierte Fundstellen: Weg zur Hochalpe, Mondseerberg und oberer Vöcklalauf. Gerne auf kalkreichem Boden.
E. cyparissias L. (Zypressen-W.). Sehr verbreitet. He.: „Trotzdem *E. c.* xerophytisch ist, ist sie ein Formationsubiquist.“
E. peplus L. (Garten-W.). In Vorgärten zerstreutes Unkraut.
E. falcata L. (Sichelblättrige W.). Äußerst selten, nur auf dem Bahndamme.

Callitrichaceae.

- Callitriche* sp. Scop. (Wasserstern). Zerstreut, große Vliese bildend. 1. Halber Weg zwischen Kolomann und Scherntanneralpe. 2. Tümpel westlich von Harpoint. 3. Tümpel auf dem Koglerberg. 4. Stagnierende Wässer nördlich des Sees.

Buxaceae.

- Buxus sempervirens* L. (Buchsbaum). Wurzgärten. Friedhof.

Aquifoliaceae.

- Ilex aquifolium* L. (Stechpalme). „Schroadla“, „Schredl“. Nähe vieler Bauernhäuser; oft sehr alte, große Bäume. Auf kalkigerem Boden gut gedeihend. Pflege mit mystisch-religiösen Gebräuchen zusammenhängend.

Celastraceae.

- Evonymus europaea* L. (Gemeiner Spindelbaum). Zerstreut, gegen Süden häufiger werdend, kalkreichere Unterlagen bevorzugend.
(*E. latifolia* Miller, Breithl. Sp., erst südl. von Mondsee, ebenso *Staphylea pinnata* L., Pimpernuß.)

Rhamnaceae.

- Rhamnus cathartica* L. (Gemeiner Kreuzdorn). Zerstr. Gebüsche mit Kalkmoränengeröll.
R. frangula L. (Faulbaum). „Hundsbierstaudn“. Sehr verbr. Bes. auffallend in den Mooren. Feuchtigkeitsl., bodenvag.

Vitaceae.

- Vitis vinifera* L. (Weinstock). An einigen Häusern. Reift nur in warmen Sommern halbwegs.
Parthenocissus quinquefolia Fritsch („Wilder Wein“). In Zell selten, in Oberhofen häufiger kultiviert.

Tiliaceae.

- Tilia cordata* Mill. (Winter-Linde). „Kais. Wegwald“, gepfl. O. R. Vorgärten.
T. platyphyllos Scop. (Sommer-L.). Sehr häufig bei Kapellen, Bildstöcken. Riesenlinde auf dem Dorfplatze von Zell wurde auf mindestens 200 Jahre geschätzt, war über 30 m hoch, 6 m Stammumfang. Vom Sturme am 4. Juli 1929 gefällt! T. p. zweifellos einheimisch. (Lindau.) Früchte und Schnüre aus Lindenbast in d. Pfahlbauten v. Mondsee. (S. M.) Schnitzereien. (Siehe Kultur!) Blüten als Tee wenig bekannt.

Malvaceae.

- Althaea off.* L. (Eibisch). Bisweilen gepfl. (Heilkraut).
Althaea rosea Cav. (Pappelrose). Seltene Zierpflanze.
Malva crispa L. (Krause Käsepappel). Vorgärten.
M. silvestris L. (Wilde K.). Äußerst selten, Hausnähe.
M. mauritanica L. (Garten-K.). „Povelfingerln“, „Schneefingerln“. Sehr verbr. bei den Häusern. Früher Heilkraut, jetzt haupts. als Zierpflanze. Früchte beliebtes Kinderspielzeug. Nach Wimmer Blätter in alten Zeiten Gemüse.
M. neglecta Wallr. (Gem. K.). Selten in Oberhofen. Pf. S.
Lavatera trimestris L. (Gartenstrauchpappel). Gärten.

Guttiferae.

- Hypericum humifusum* L. (Niedergestr. Johanniskr.). Äußerst selten: Südwesthang des Koglerberges.
H. maculatum Cr. (Vierkantiges J.). 1. subsp. *eumaculatum* Schinz et Thell., var. *genuinum* Fröhlich. Zerstr. Gipfel d. Kolomann, Hänge oberh. Harpoint. 2. subsp. *eumaculatum*, var. *genuinum*, f. *glabrum*. Sehr verbr. an feuchten Stellen.
H. acutum Mnch. (Vierflügeliges J.). An Bächen d. mittl. Lagen. Zerstr.
H. perforatum L. (Gemeines J.). „Sonnwendkraut“. Zerstr. an trockeneren Stellen. Blüten in Schmalz gebr.: Wundheilmittel.

Droseraceae.

- Drosera rotundifolia* L. (Rundbl. Sonnentau). Sehr verbr. in den Sumpfwiesen nördl. d. Sees u. i. den Hochmooren.
D. intermedia Hayne u. *D. longifolia* L. (Mittlerer u. langbl. S.). In mancherlei Formen, die kaum zu trennen sind, in den kalkreicheren Sumpf- u. Moorstellen.
Cistaceae. (*Helianthemum ovatum* (Viv.) Dun. u. *H. nitidum*, Trübgrünes u. Kahles Sonnenröschen, erst südl. d. u. G.)

Violaceae.

- Viola collina* Bess. (Hügel-Veilchen). Zerstr. auf Vorhügeln d. östl. H. Kalkliebend.
V. tricolor L. (Dreifarbige V.). Subsp. *arvensis* Gaudin, var. *agrestis* × *segetalis*, u. *V. tr.* subsp. *vulg.* sind verbr. Ackerunkräuter.
V. silvestris Lam. (Wald-V.). Zieml. verbr. i. d. Wäldern.
V. odorata L. (Wohlriechendes V.). Zerstr. 1. Nähe des Schulhauses (verwildert). 2. Oberrauergraben am Irrsberg.
V. hortensis Wettst. (Stiefmütterchen). Gärten.
(*V. palustris* L., Sumpfeveilchen, von Hi. für d. Mondseer Gegend angegeben.)
(Die kalkliebenden V., wie *V. mirabilis*, Merkwürdiges V., fehlen im u. G.)

Cucurbitaceae.

- Cucumis sativus* L. (Gurke). Mittelmäßig gebaut in Gärten.
Cucurbita pepo L. (Kürbis). Zieml. selten gebaut.
(*Bryonia alba* L. u. *B. dioica* Jacqu., Schwarzfrüchtige u. Rotfrüchtige Zaunrübe, fehlen.)

Thymelaeaceae.

Daphne mezereum L. (Seidelbast). In den größeren Gräben der östl. H. sehr verbreitet. Kalk-, schatten- u. feuchtigkeitsl. „Zwilindenblüh“.

(*D. laureola* L. u. *D. cneorum* L., Immergrüner S. u. Steinröslein, fehlen.)

Elaeagnaceae. (*Hippophaë rhamnoides* L., Sanddorn, von Westen her in der Nähe d. Bahndammes gegen den Irrsberg zu, aber außerh. d. u. G. O. R.)

Lythraceae.

Lythrum salicaria L. (Weiderich). Var. vulg. *D. C. subv. glabricaula* Koehne f. *bracteatum* Peterm. Auß. verbr. Nasse Stellen in niederen u. mittl. L.

Oenotheraceae.

Chamaenerion angustifolium Scop. (Unholdenkraut). Verbr., bes. in Neubrüchen. Sehr häufig auf dem Kolomann und auf dem Osthange des Irrsberges. (700–800 m.)

Epilobium parviflorum Schreber (Kleinblütiges Weidenröschen). Die häufigste E.-Art im u. G. An Bächen, in Auen, an feuchten Waldstellen usw., vorzugsw. auf kalkigem Boden.

E. roseum Schreb. (Rosenrotes W.). Zerstr. Nähe von Zell.

Circaea intermedia Enrh. (Mittleres Hexenkraut). Ziemlich selten, gruppenw.

C. lutetiana L. (Großes H.). Sehr verbr. an schattigen und feuchten Orten, bes. auf den westl. H.

Halorrhagidaceae.

Myriophyllum spicatum L. (Ähriges Tausendblatt). Sehr verbr. im See.

(*M. verticillatum* L., Quirlblättriges T., nach Hi. im Mondsee.)

(*Hippuris* vulg. L., Tannenwedel, fehlt; nach Hi. u. Schulrat Naderer in Mondsee.)

Araliaceae.

Hedera helix L. (Epheu). „Wintergrün“. Äußerst verbr., bes. an lichterem Waldstellen. Vorliebe f. oz. Klima u. Kalk.

Umbelliferae.

Sanicula europaea L. (Heilknecke). In vielen Ass. äußerst verbr. Waldpflanze. Buchenbegleiter.

Astrantia maior L., subsp. *eumaior* Grintzesco var. *maior* Wimmer et Grabowski (Große Sterndolde). Verbr. in Bergwäldern u. auf Wiesen, bes. auf dem Koglerberg. Vorliebe für Kalkböden.

Chaerophyllum bulbosum L. (Kerbelrübe). Selten. Feuchtigkeitsl. Siehe w. u.

Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. (Wiesen-K.). Äußerst verbr., bes. in den Laubwiesen. Dünger- u. feuchtigkeitsl. „Wassergas“.

(*Cicuta virosa* L., Giftiger Wasserschierling, fehlt. Nach Hi. Mondsee u. Mattsee.)

(*Conium maculatum* L., Gefleckter Schierling, fehlt. Nach Hi. bei Mondsee.)

Apium graveolens L. (Sellerie). Selten in Vorgärten.

Petroselinum hortense Hoffm. (Petersilie). Einige Vorgärten in Zell und Oberhofen.

Carum carvi L. (Kümmel). Zerstr. in verschied. Wiesenassoz.

Pimpinella maior Huds. var. vulg. Thellung (Große Bibernelle). Ziemlich verbr., bes. auf den feuchten Hügelwiesen.

- P. saxifraga* L. (Gemeine B.). In der typischen Form äußerst verbr. Wiesenpflanze. Wird auf trockeneren Wiesen durch *f. dissecta* abgelöst. Als Heilpflanze kaum mehr bekannt, nur einmal noch hörte der Verf. den alten Spruch: „Kudelkraut und Pimpernell, kommt der Tod net gar so schnell.“
- P. saxifraga* L., subsp. *eu-saxifr.* Thell., subvar. *glabra* M. u. K. *f. rosea* O. K. Äußerst selten auf dem Kolomannsgipfel, sehr häufig auf dem Schafberg.
- Aegopodium podagraria* L. (Geißfuß). „Erdhojer“. Ist in Hausnähe am meisten verbr. Feuchtigkeitsl.
- Aethusa cynapium* L. (Hundspetersilie). Selten. Vorg.
- Anethum graveolens* L. (Dill). Einige Vorgärten.
- Angelica silvestris* L. (Wilde Engelwurz). Äußerst verbr. im Phragmitetum, entlang der Bäche. Sehr feuchtigkeitsl. Abnormale Formen, die in mancher Beziehung *Ostericum palustre* Better ähnlich, nördl. d. Sees.
- Levisticum officinale* Koch 1824 (Liebstöckel). Selten in Bauerngärten. Verwendung für Wundpflaster.
- Peucedanum palustre* (L.) Mnh. (Sumpf-Haarstrang). In den Schilfbeständen äußerst verbr. Extrem feuchtigkeitsl.
- Pastinaca sativa* L. (Pastinak). Selten.
- Daucus carota* L. (Gelbe Rübe). Wiesen, äußerst verbr. Selten in Zell, häufiger in Oberhofen und in der Haslau gebaut.
- Chaerophyllum Villarsii* Koch (Alpen-Kälberkropf). Verbr.: Kolomann, Hasenkopf, Vöcklalauf im Walde; kalkmeidend. Besondere Formen: 1. An quelligen Orten weißgefleckte Blätter. 2. *lus. roseum* Payot. Auf dem Hasenkopf.
- Ch. cicutaria* Vill. (Rauhhaariger K.). Äußerst verbr. Stark untermischt von rosafarbenen Formen. Feuchtigkeitsfordernd.
- Heracleum sphondylium* L. (Bärenklau). „Bärntazn“. Äußerst verbr. Nach dem Schnitte bes. kräftig blühend. Blätter als Ferkelfutter.

Cornaceae.

- Cornus sanguinea* L. (Roter Hartriegel). Verbr. in den Gebüsch. Urwüchsig. (Früchte i. d. Pfahlbauten von Mondsee. S. M.) Bodenvager Mesophyt. (Pflanze, die mittlere Feuchtigkeit verlangt.)
- (*C. mas* L., Kornelkirsche, fehlt.)

Sympetalae.

Pirolaceae.

- Pirola minor* L. (Kleines Wintergrün). Verbr. Lackerberg, Kolomann. Nicht zu trockene Waldstellen. Bodenvag.
- Monotropa hypopitys* L. (Fichtenspargel). Verbr. in den Wäldern und Hainen bis zum See hinunter.

Ericaceae.

- Vaccinium myrtillus* L. (Heidelbeere). „Zöpern“. Äußerst verbr., oft große Waldstrecken bedeckend, verläßt auch den Wald. „Schwarzbeer“. Für Besen.
- V. uliginosum* L. (Moor-H.). Äußerst verbr. in den Mooren.
- V. oxycoccos* L. (Moosbeere). Hoch- u. Flachmoore verbr. „Moosbirl“ werden gesammelt und eingesotten.
- V. vitis idaea* L. (Preiselbeere). Verbr. bes. in Moornähe.

- Calluna vulgaris* (L.) Hull (Besenheide). „Sendel“. Früher Verwendung für Besen. Ziemlich verbr. In Flachmooren weiße Form. (Selten.)
Andromeda polifolia L. (Kienporst). Verbr. in den Hoch- u. Flachmooren.
 Oft macht ein Pilz die Pflanze fleischig und tief rot.
 (*Arctostaphylos uva ursi* Spr., Bärentraube, fehlt.)

Primulaceae.

- Primula elatior* (L.) Schreb. (Hohe Schlüsselblume). Äußerst verbr. in den meisten Wiesen, auch Grabenhänge (feuchte Schattenlagen).
 (*P. vulgaris* Huds., Stengellose S., fehlt.)
 (*P. veris* L., Frühlings-S., fehlt: thermophil.)
P. farinosa L. (Bestäubte S.). Verbr.: 1. Wiesen nördl. d. Sees. 2. Wiesen oberhalb des Epplbauern, vor Harpoint. 3. Nördl. v. Unterschwand.
 (Alle *Androsaceae*-Arten fehlen: bevorzugen nur ausgesprochen trockene Gebiete.)
Soldanella montana Willd. (Alpenglöckchen). Sehr verbr., namentlich auf den westl. H.
Lysimachia nummularia L. (Pfennigkraut). Sehr verbr. an den Wassergräben. Wie in den Bayrischen Alpen bis 800 m hoch steigend. Feuchtigkeitsfordernd.
L. nemorum L. (Kleines Pf.). Sehr. verbr. Feuchte Waldstellen.
L. vulgaris L. (Weidenkraut). Sehr verbr. Seenähe, beim Moòr I.
Anagallis arvensis L. (Acker-Gauchheil). Verbreitetes Ackerunkraut, wird gegen Oberhofen zu noch häufiger.
 (*A. femina* Mill., Blaues G., fehlt.)
 (*Cyclamen europ.* L., Gem. Erdbrot, fehlt. Häufig südl. v. Mondsee.)

Oleaceae.

- Fraxinus excelsior* L. (Esche). Äußert verbr.: Seeufer, entlang der Bäche, lichtere Waldstellen usw. Feuchtigkeitsl. u. kalkl.
Ligustrum vulgare L. (Rainweide). Zerstr., kalkhold.
Syringa vulgaris L. (Flieder). Vorgärten.

Gentianaceae.

- Centaurium pulchellum* Druce (Kleines Tausendguldenkraut). Kasten—Unterschwand. Niedere Lagen. Feuchtigkeitsl.
C. umbellatum Gilib. (Echtes T.). Selten. Durch die Kräutersammler stark dezimiert. Gegend d. Neuhäusels, bei Guggenberg u. nördl. der Erlachmühle. Von der Ostgrenze des u. G. an immer häufiger nach W.
Gentiana pneumonanthe L. (Lungen-Enzian). Zerstr. Wiesen nördl. d. Sees u. auf dem Lichtenberg. Kalkl., feuchtigkeitsfordernd.
G. verna L. (Frühlings-E.). „Himmelsveigerl“, „Himmelssterndl“, „Schusternagerl“, verbr., besonders auf dem Wege zwischen Eppelbauer u. Harpoint. Bodenvag.
G. ciliata L. (Gefranster E.). Zerstr. auf den östl. und westl. H. Kalkliebend.
G. sturmiana Kern. (Rauher E., Herbstform). Äußerst verbr. in mittleren Lagen. Kalk- u. feuchtigkeitsfordernd.
G. asclepiadea L. (Schwalbenwurzartiger E.). „Kreuzwurz“. Leitpflanze. Vorliebe für Kalk. Waldform mit einseitwendigen Blüten und wedelartig angeordneten Blättern, Sumpfform mit wirtelig stehenden Blättern u. Blüten. (f. *pectinata* u. f. *cruciata* W. u. Sch.)

Menyanthaceae.

Menyanthes trifoliata L. (Fiebertklee). Äußerst verbr. an überfluteten Stellen. Ausmündung der Ache. Nord- und Nordostufer des Sees; meist große Bestände bildend. Meidet Kalk.

Apocynaceae.

Vinca minor L. (Kleines Sinngrün). Ziemlich verbreitet. Bei der Ortschaft Laiter dicht an der Straße und zu beiden Seiten des Schabachgrabens langgezogene, dichte Herden bildend. Ziemlich bodenvag.

Nerium Oleander L., (Oleander). Vereinzelt bei Bauernhäusern kultiviert. (Asclepiadaceae. Die *Cynanchum*-Arten, Schwalbenwurz, fehlen. Jenseits des Mondsees sind sie aber sehr häufig.)

Convolvulaceae.

Calystegia sepium R. Br. (Zaunwinde). Verbreitet: Badeplatz und besonders in Unterschwand. (Also nur Beckengrund.) Auf „Schieferstankn“ (Schilfstengeln) massenhaft windend.

Convolvulus arvensis L. (Ackerwinde). „Umwindn“. Verbreitetes Ackerunkraut. Sehr gerne im Hafer.

Cuscuta epilinum Weihe (Flachsseide). Nur dann im Lein äußerst verbreitet, wenn dieser gleich nach dem Düngen gebaut wird. Allerdings in diesem Falle ganze Flachsfelder verwüstend.

C. epithymum (L.) Murr. (Quendel-S.). „Nestlgrind“. Auf verschiedenen Wirtspflanzen, beispielsweise auf *Centaurea jacea*, *Trifolium* usw.; ersetzt auf Klee die im u. G. nicht gefundene eigentliche Kleeseide, *C. trifolii* Bab. Von den Polemoniaceae wurden *Phlox paniculata* L. (Flammenblume) in Wurzgärten und Vorgärten und *Polemonium coeruleum* L. (Sperrkraut) in einem Wurzgarten Unterschwands gefunden.

Borraginaceae.

Symphytum officinale L. (Gemeine Beinwurz). „Schwarzwurzel“. Äußerst verbreitet an feuchten Wiesenstellen, besonders in den Breitblattwiesen. Verwendung der Wurzel bei Beinbrüchen. Die Blätter sind, — in Teig gebacken, — ein beliebtes Volksnahrungsmittel.

S. tuberosum L., Knollige B., zerstreut. Geschlossenes Verbreitungsgebiet südlich von St. Lorenz.

Pulmonaria officinalis L. (Gebräuchliches Lungenkraut). Äußerst verbreitet, kleinere Wälder oft ganz einsäumend. Feuchtigkeitsl.

(*P. angustifolia* L., Schmalblättriges L., nach Hi. seltenes Vorkommen in der Mondseer Gegend.)

Myosotis scorpioides L. (Sumpf-Vergißmeinnicht). Verbreitet auf feuchten Waldstellen an beiden H., an Gräben.

M. silvatica Hoffm. (Wald-V.). Zerstreut im Walde.

M. arvensis Mill. (Acker-V.). Verbreitetes Ackerunkraut.

Lithospermum officinale L. (Gebräuchlicher Steinsame). Vereinzelt in verwilderten Gärten (Haustätter, Moränengegend) und im Friedhofe. Kalkliebend.

(*Cerinth minor* L., Wachsblume, fehlt. Neumarkt Hi.)

Beachte die auffallend geringe Artenzahl der Borraginaceae im u. G., von welcher Familie eben sehr viele Vertreter xeromorph sind! Xeromorph: der Trockenheit angepaßt.

Verbenaceae.

(*Verbena officinalis* L., Eisenkraut, fehlt. Erst von der Linie Fuschl—St. Gilgen—St. Wolfgang an geschlossen gefunden.)

Labiatae.

Ajuga genevensis L. (Berg-Günsel). Zerstreut an trockenen Stellen der westl. H.

A. reptans L. (Kriechender G.). Ziemlich verbreitet. Zweite Blüte Ende August. Formen mit behaartem Stengel. Feuchtigkeitsliebend.

Scutellaria galericulata L. (Gemeines Helmkraut). Zieml. selten. Nordw. des Sees.

Glechoma hederacea L. (Gundelrebe). „Gundelrebe“. Zerstreut. Heilmittel. Gartennähe. Etwas feuchtigkeitsl.

Prunella vulgaris L. (Gemeine Brunelle). Äußerst verbreitete Wiesenpflanze, lichte Waldstellen.

(*P. grandiflora* (L.) Jacqu. Erst südl. des u. G.)

Galeopsis bifida Bönn. (Ausgerandete Hanfnessel). Selten. Hölzchen bei Rabenschwand. Vorzügl. auf Kalk. 1929: Fuß d. Heißig.

G. pubescens Bess. (Flaumige H.). „Roter Luaga“. Selten. Bei Wegdorf nahe der Straße.

G. speciosa L. (Bunte H.). „Gelber Luaga“, „Böhmische Taubnessel“. Leitpflanze. Äußerst verbr. Wird gesammelt. Feuchte Wiesen (vorherrschend!), feuchte Waldstellen.

G. tetrahit L. (Große H.). Verbr. Weiß, selten rot.

G. angustifolia Ehrh. (Schmalblättrige H.). Selten. Erst seit 1927 auf dem Bahndamme.

Lamium luteum L. (Echte Goldnessel). Selten, gruppenw. Bodenvag.

L. purpureum L. (Kleine Taubnessel). Verbr.

(*L. amplexicaule* L., Acker-T., u. *L. album* L., Weiße T., fehlen.)

L. maculatum L. (Gefleckte T.). Verbr. Mondsee häufiger.

Ballota nigra L. (Stinkandorn). Selten. 1927 eingeschleppt.

Stachys lanata Jacqu. (Wolliger Ziest). „Schafohrn“. Zerstr. Wurzgärten, Friedhof.

St. officinalis (L.) Trevis. (Flohblume). Sehr verbr.

St. palustris L. (Sumpf-Ziest). Zerstr., östl. H.

St. silvatica L. (Wald-Z.). Sehr verbr. Wälder u. deren Vorgebiete.

St. alpina L. (Alpen-Z.). Äußerst selten. H. des Irrsberges.

Salvia glutinosa L. (Klebriger Salbei). Sehr verbr. Feuchte Waldst. „Soafä“.

S. officinalis L. (Echter S.). Vorgärten.

(*S. pratensis* L., Wiesen-Salbei, fehlt. Westl. d. Sommerholzer Sattels.)

S. verticillata L. (Quirlblütiger S.). Selten, östl. v. Zell.

Satureia hortensis L. (Pfefferkraut). Wurzgärten. „Boazkräutl“.

S. acinos (L.) Scheele (Steinquendel). Selten. Bahndamm.

S. vulgaris (L.) Fritsch (Wirbeldost). Äußerst verbr., bes. an Waldrändern, in Vorhölzern unter Gebüsch u. unter einzeln stehenden Baumgruppen. Am Zellerbach, nahe der Mündung, eine reinweiße Form.

(*S. alpina* (L.) Scheele, Alpenquendel, erst südlich der Südgrenze des u. G. von Wartenfels an.)

Origanum vulgare L. (Gemeiner Dost). Von Zell gegen Süden zu (Achentäl) häufiger werdend. Verbreitet.

- Thymus vulgaris* L. (Thymian). Zerstreut in Wurzgärten. Verwendung: Gewürz und Heilkraut. (Siehe *Pimpinella sax.*)
- T. ovatus* Mill. (Eiblättriger T.). Äußerst verbreitet an trockenen Stellen der Wiesen. Besiedler der Maulwurfs- und Ameisenhügel.
- Lycopus europaeus* L. (Wolfsfuß). Sehr selten. Nur ein Fundort: oberhalb des Forsthauses von Oberhofen, Weg auf den Koglerberg. Extrem feuchtigkeitsliebend.
- Mentha aquatica* L. var. *capitata* und var. *subspicata* Neilr. (Wasser-Minze). Äußerst verbreitet in allen Gräben. Extrem feuchtigkeitsfordernd.
- M. longifolia* Huds. (Wald-M.). Äußerst verbreitet an Bachrändern, besonders auffallend in der Gegend des Neuhäusels. Feuchtigkeitsfordernd.
- M. verticillata* L. var. *paviflora* Roth (Wirtelblütige M.). Zerstreut in der Umgebung Zells und an den Wegböschungen südwärts des Sees.
- (Alle *Teucrium*-arten, Gamander, fehlen. *T. scorodonia* L., Salbeiblättriger G., erst bei Hüttenstein; *T. montanum* L., Berg-G., im Schafberggebiete; *T. chamaedrys* L., Gemeiner G., Wiese bei Wartenfels.)
- (*Melittis melissophyllum* L., Immenblatt, fehlt, wurde auch in der Umgebung des u. G. nicht gefunden.)
- Rosmarinus officinalis* L. (Rosmarin). Beliebte Topfpflanze.

Solanaceae.

- Lycium halimifolium* Mill. (Bocksdom). Äußerst selten, nur bei Häusern in der Haslau.
- Atropa belladonna* L. (Tollkirsche). Verbreitet auf beiden H. Feuchtigkeitsliebend, bodenvag.
- Solanum tuberosum* L. (Kartoffel). Anbau mannigfaltigster Sorten. Gedeiht nur in relativ trockenen Jahren recht gut. (1927).
- S. lycopersicum* L. (Paradiesapfel). In wenigen Vorgärten. Frucht wird nur in relativ trockenen und sonnigen Jahren gut reif. Den Bauern unbekannt.
- S. dulcamara* L. (Bittersüß). Sehr verbreitet in feuchten Hecken. Bodenvag. (*S. nigrum* L., Schwarzer Nachtschatten, fehlt.)
- Nicotiana* sp. (Tabak). In der Nähe von Wurzgärten, vereinzelt verwildert aus der Kriegszeit her.
- Hyoscyamus niger* L. (Schwarzes Bilsenkraut). Sehr selten, das eigentliche u. G. von drei Seiten her einschließend: Oberhofener Gegend (von Norden her), um den Mondsee und ostwärts im Attergau. (Pf. S. u. O. R.)

Scrophulariaceae.

- Verbascum nigrum* L. (Schwarze Königskerze). Zerstreut. Friedhof von Zell, vereinzelt in Hausnähe auf den östl. H. in tieferen Lagen; unteres Achenal, gegen Mondsee zu, häufiger werdend.
- V. thapsus* L. (Kleinblütige K.). Sehr selten, nur ein ständiger Fundort: Gebüsch nahe der Ausmündung des Zellerbaches. Zufällig vor Harpoint. (Häufig in der Neumarkter Gegend.) Haslau. W. R.
- (Die übrigen *Verbascum*-arten fehlen, da sie meist ausgesprochen xeromorph sind.)
- Scrophularia nodosa* L. (Braunwurz). Verbr. längs der Bäche. Gebüsche, Ausgehend und ruderal im Friedhofe. Feuchtigkeitsliebend. (*S. alata* Gilib., Geflügelte B., fehlt.)
- Veronica arvensis* L. (Feld-Ehrenpreis). Zerstreut auf Äckern und Brachen.

- V. Tournefortii* Gmel. var. *Aschersoniana* (Persischer E.). Ziemlich verbreitetes Ackerunkraut.
- V. polita* Fr. (Glatter E.). Selten in Vorgärten.
- V. agrestis* L. (Acker-E.). Selten auf Brachen u. Äckern.
- V. officinalis* L. (Gebr. E.). Zerstreut in den Bergwäldern, bes. auf Waldschlägen. Lackerberg.
- V. chamaedrys* L. (Gamander-E.). Selten auf Wiesen in Waldnähe.
- V. montana* L. (Berg-E.). Äußerst selten in den Mischwäldern der westl. H. Schattenl.
- V. anagallis* L. (Gem. Wasser-E.). Sehr verbr. in den Sumpfwiesen nördl. des Sees. Extrem feuchtigkeitsl.
- V. beccabunga* L. (Quellen-E.). Äußerst verbr. in fast allen kleineren Wasserläufen. Extrem feuchtigkeitsfordernd.
- (*V. scutellata* L., Schildfrüchtiger E., fehlt wahrscheinlich. Nach Hi. Gegend von Seekirchen und Mattsee.)
- (*V. urticifolia* L., Nesselblättrige E., erst südl. von Mondsee.)
- (*Cymbalaria muralis* G. M. Sch., Zimbelkraut, fehlt. Selten in Mondsee, verbr. in Neumarkt an altem Mauerwerk.)
- Linaria vulgaris* L. (Gemeines Leinkraut). Sehr selten. Am 12. September 1927 zum ersten Male auf dem Bahndamme gefunden.
- Melampyrum cristatum* L. (Kammähriger Wachtelweizen). Sehr selten, von Norden her eindringend. D.
- M. arvense* L. subsp. *arvense* (Acker-W.). „Taubnwoaz“. „Der Bruder des Kloft“. Zerstr., meist in Weizenfeldern.
- M. pratense* L. (Wiesen-W.). Verbreitet. Waldbestände östl. der Sumpfwiesen, nördl. des Sees.
- M. silvaticum* L. (Wald-W.). Nähe von Moor II. Zerstreut.
- Euphrasia stricta* Host subsp. *stricta* Wettst. (Steifer Augentrost). Äußerst selten in den Äckern von Guggenberg.
- E. Rostkoviana* Hayne (Gem. A.). „Jakobibleaml“, „Schneebileaml“, „Milchdiab“, La. Äußerst verbr. Nach der Häufigkeit wird der Schneereichum des kommenden Winters vorhergesagt.
- E. Rostkoviana* f. *uliginosa* Ducom. (Sumpf-A.). Verbr. nord- u. südwärts des Sees. Nur auf feuchtem Boden.
- E. salisburgensis* Funk (Salzburger A.). Selten, Hochalm (Hofalm).
- Odontites rubra* Gilib. subsp. *verna* Hayek (Ackerrasse), (Zahntröst). Verbr., bes. am Saume der Roggenfelder.
- Alectorolophus maior* Ehrh. (Rchb.) subsp. *montanus* Hayek (Großer Klappertopf). „Kloft“, „der Bruder des Taubenwoaz“. Äußerst verbr., bes. in Schilfnähe.
- A. hirsutus* All. (Rauhhaariger K.). „Wiesenkloft“. Verbr.
- A. minor* Wimm. et Graeb. (Kleiner K.). Verbr. Wiesenunkraut. Feuchtigkeitsl.
- Chaenorhinum minus* (L.) Lge. (Kleiner Orant). Erst seit August 1927 auf dem Bahndamm.
- (*Digitalis ambigua* Murr., Großblütiger Fingerhut, erst südlich d. Mondsees.)
- Pedicularis palustris* L. (Sumpf-Läusekraut). Sehr verbr. nördl. des Sees. Feuchtigkeitsfordernd.
- Lathraea squamaria* L. (Schuppenwurz). Verbr. bei Buchenbeständen. Feuchtigkeitsl.

Lentibulariaceae.

- Pinguicula vulgaris* L. (Gem. Fettkraut). Äußerst verbr., bes. an feuchten Böschungen; in Höhen bis über 750 m.
Utricularia minor L. (Kleiner Wasserschlauch). Verbr. in den Sumpfwiesen nördl. des Sees.

Orobanchaceae.

- Orobanche barbata* Poir. (Kleeteufel). „Kleefresser“. Äußerst verbr. in den Kleefeldern.
 (O. *ramosa* L., Hanftod, fehlt trotz der vielen Hanffelder.)
 (Globulariaceae, Kugelblumengew., fehlen.)

Plantaginaceae.

- Plantago lanceolata* L. (Spitzwegerich). Äuß. verbr.
P. maior L. (Gem. W.). Sehr verbr. auf Wegen, in Hausnähe. „Broatwegerer“. „Grasdiab“. La.
P. media L. (Mittl. W.). Sehr. verbr. Wiesenpflanze. „Heudiab“. La.

Rubiaceae.

- Sherardia arvensis* L. (Ackerröte). Verbr. auf Äckern.
Asperula odorata L. (Waldmeister). Äuß. verbr. in Mischwäldern.
 (A. *cynanchica* L., Kleiner Waldmeister, fehlt.)
Galium mollugo L., subsp. *mollugo* Hayek, var. *angustifolium* Leers. (Gem. Labkraut). Äußerst verbreitet in den Wiesen und deren benachbarten Assoziationen.
G. verum L., subsp. *verum* Hayek (Gelbes L.). Selten. Auf dem Gommersberg in 800 m Höhe. (He.: „In O.-Ö. nur bis 700 m.“) Von hier gegen den Attergau zu immer häufiger werdend.
G. uliginosum L. (Schlamm-L.). Zerstreut im Vorgebiete der Moore I und II und an sumpfigen Stellen in der Haslau u. b. See. Feuchtigkeitsfordernd.
G. palustre L. (Sumpf-L.). Zerstreut an feuchten Stellen.
G. rotundifolium L. (Rundblättriges L.). Sehr verbreitet in den Wäldern beider H.
G. cruciata Scop. (Kreuz-L.). Ziemlich selten nahe den Osthängen d. Irrsberges.
G. aparine L. (Klimmendes L.). Verbreitet auf Brachen, im Walde. Die Früchte heißen „Kleberln“.
G. asperum Schreber (Rauhes L.). Selten: Vorgebiet des Moores II, b. See.
 (G. *silvaticum* L., Wald-L., fehlt. Häufig südwärts der Linie Mondsee—Südrand des Attersees.)

Caprifoliaceae.

- Sambucus ebulus* L. (Zwerg-Holunder). Selten; nur eine Fundstelle: Weg in der Nähe von Harpoint.
S. racemosa L. (Trauben-H.). „Bergholerer“. Z. verbr. auf den westlichen H., verbreitet auf den östlichen H. Gegen Süden zu (ab Lackerberg) häufiger werdend.
S. nigra L. (Schwarzer H.). Gebüsch, Hausnähe. Ziemlich verbreitet, feuchtigkeitsliebend.
Diervilla florida S. Z. (Weigelia). Vorgärten in Oberhofen, in Zell unbekannt, dann wieder in Mondsee.
Viburnum lantana L. (Wolliger Schneeball). Zerstreut. 1. Oberhalb des Wolfbauern. 2. Mondseerberg. Gegen Süden zu häufiger werdend, äußerst

verbreitet erst in der Fuschler Gegend. Bes. auf Kalkboden, xerophil
Endozoische Verbreitung durch Vögel. (Xerophil: trockenheitsl.).

V. opulus L. (Gemeiner Schneeball). Sehr hartes Holz f. Rechenzähne.
Äußerst verbr. Seenähe. Feuchtigkeitsl. „Lungenbirl“.

Symphoricarpus racemosus Mich. (Schneebeere). Ziemlich selten, gerne bei
Hauskapellen.

Lonicera xylosteum L. (Gem. Heckenkirsche). „Boanlweiher“. Verbr. in Ge-
büschen, an den Rändern größerer Bäche.

L. nigra L. (Schwarze H.). Sehr selten. Vorgebiet des Moores I.

(*L. caprifolium* L., Gem. Geißblatt, erst in Mondsee kultiviert.)

L. alpigena L. (Alpen-H.). Zerstr. Hausstattergraben u. v. d. Moore I.

Valerianaceae.

Valerianella dentata Poll. (Gezählter Feldsalat). Zerstr. in verschiedenen
Äckern, beginnt erst einzudringen.

V. locusta Betcke (Gem. F.). Zerstr. Vorgärten und Äcker.

Valeriana officinalis L. (Gem. Baldrian). Feuchte Waldränder, von Süden her
zerstr.

V. dioica L. (Kleiner B.). Verbr. in Seenähe.

(*V. tripteris* L., *V. saxatilis* L. u. *V. montana*, Dreischnittiger, Felsen u. Berg-B.,
erst südlich des u. G. Hi.)

Dipsacaceae.

Dipsacus silvestris Mill. (Wilde Karde). Äußerst selten auf nassen, wüsten
Stellen. Friedhof. Nur in der Beckensohle.

Succisa pratensis Mnch. (Teufelsabbiss). Leitpflanze. Äußerst verbr. auf
Wiesen. Feuchtigkeitsfördernd. In den Niedermooren eine hohe Sumpf-
form.

Knautia arvensis (L.) Coult. (Gem. Witwenblume). Verbr., bes. Wiesen von
Unterschwand.

K. dipsacifolia (Host) Gren. et Godr. var. *dipsacif.* f. *semicalva* (Karden-
blättrige W.). Äußerst verbr. Waldränder. Feuchtigkeitsl.

Scabiosa columbaria L. subsp. *columbaria* (Grindkraut). Selten. Wiesen
zwischen Zell u. Harpoint.

Campanulaceae.

Campanula glomerata L. (Geknäuelte Glockenblume). Sehr verbreitete
Wiesenpfl. Große autumnale Form (Herbstform).

C. rapunculoides L. (Rapunzelartige G.). Sehr zerstr.

C. trachelium L. (Nesselblättrige G.). Äußerst verbr. Leitpflanze. Straßen-
böschungen, Waldränder, Holzschläge usw. Feuchtigkeitsliebend.

C. latifolia L. (Breitblättrige G.). Äußerst selten. Südl. von Unterschwand,
Seenähe. Feuchte Stellen.

C. rotundifolia L., subsp. *rotundifolia* Witasek, var. *stricta* Schumacher (Rund-
blättrige G.). Verbr. auf getrennten Fundorten (Straßennähe bei Weg-
dorf, längs der Mauer des Zellerbachs; Wiese vor der Scherntanner-alpe
usw.) Immer in großen Herden.

C. patula L. (Wiesen-G.). Äußerst verbr. auf Wiesen, doch auch in lichterem
Waldstellen; wie Hain beim Bad.

Legousia speculum (L.) Fisch. (Venussspiegel). Verbreitetes Ackerunkraut.

Phyteuma spicatum L. (Ährige Rapunzel). Äußerst verbr. in allen Pflanzengesellschaften der Wälder.

Ph. orbiculare L. (Rundköpfige R.). Äußerst selten, nur ein Fundort: ostwärts von Wegdorf. Sonst im allgemeinen bodenvag, allerdings auf Kalk häufiger.

Compositae.

Eupatorium cannabinum L. (Gem. Wasserdost). Äußerst verbr. in den verschiedensten auf feuchtem Boden stehenden Assoziationen: „Wilder Hanef“.

Adenostyles alliariae Kern. (Alpendost). Äußerst verbr. auf den höheren Bergen vom südlichen Kalkgebirge her. Im allgemeinen bodenvag mit Bevorzugung feuchter Standorte, die Stellen größeren Kalkvorkommens vorziehend.

Solidago virga aurea L. (Gem. Goldrute). Sehr verbr. in den Wäldern aller Lagen. Nach oben hin in Formen, die an subsp. *alpestris* gemahnen, übergehend.

Bellis perennis L. (Gänseblümchen). „Monatsbleaml“. La. Äußerst verbreitete Wiesenpflanze.

Aster sp. (Gartenastern). In Vor- u. Wurzgärten verbr.

A. amellus L. (Berg-Aster). In Hausnähe am Westufer des Sees. (Möglicherweise Gartenflüchtling, äußerst selten.)

A. bellidiastrum Scop. (Sternlieb). Nur zwei Fundorte: 1. Nördl. des Epplbauern. 2. Oberhalb des Haustätters.

Stenactis annua (L.) Nees (Weißes Berufkraut). Seit 1927 zerstr.: Zellerbach aufwärts und Hang beim Wolfbauer.

Antennaria dioica (L.) Gärt. (Katzenpfötchen). An trockenen Stellen beider H. ziemlich verbreitet, bes. auf den westl. Waldwiesen. (Gebiet von *Nardus stricta*.)

Erigeron canadensis L. (Kanadisches Berufkraut). 1. Mäßiges Eindringen von Süden (Mondsee) her in das u. G. 2. 29./8. 1927 zum ersten Male nördl. von Oberhofen in Bahnnähe. 3. Osthang des Lichtenberges, gegen den Attergau zu.

(*Filago germanica* L., Deutsches Fadenkraut, Brachfelder um Mondsee. Hi.)

Gnaphalium silvaticum L. (Wald-Ruhrkraut). „Falsches Edelweiß“. Erst in mittleren Lagen und bes. südwärts der durch Zell gehenden West-Ostlinie: Lackerberg, Hochalm, Kolomann. Zerstr.

G. uliginosum L. var. *tomentosum* Beck (Schlamm-R.). „Ackeredelweiß“. Ackerunkraut, zerstr., bes. auf Kartoffelfeldern in Unterschwand. Feuchtigkeitsl.

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. (Perlkörbchen). Gärten, verwildert gerne.

Telekia speciosa Schreb. (Großes Ochsenauge). Kolomann, an der unteren Grenze des Forstes gegen die Bauernwälder, O. R. Äußerst selten. Wahrscheinlich von Mondsee her verwildert.

(*Buphthalmum salicifolium* L., Ochsenauge, häufig südw. d. u. G.)

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. (Ruhrwurz). Ziemlich selten. Von Dr. St. 1925 noch in Zell gefunden, die weiteren Jahre nur mehr auf dem Südwesthange des Mondseerberges. Feuchtigkeitsl.

Inula salicina L. (Weiden-Alant). Seit September 1927 von Norden her zerstreut einwandernd. Nächster geschlossener Fundort: Henndorf, jenseits des Sommerholzer Sattels.

- Inula britannica* L. (Wiesen-A.). Nur eine Fundstelle nördl. von Unterschwand: beim Langwallner.
- Rudbeckia laciniata* L. (Rudbeckie). Verbr. in Wurzgärten, wird auch gerne längs der Hausmauern gezogen. Feuchtigkeitsl., daher im u. G. üppig gedeihend; manchmal verwildert.
- Helianthus annuus* L. (Sonnenrose). Verbr. in Wurz- u. Vorgärten.
- H. tuberosus* L. (Erdbirne). Selten in Wurzgärten in Rabenschwand.
- Bidens tripartita* L. (Dreiteiliger Zweizahn). Zieml. selten an verschiedenen Stellen der Beckensohle. (Schwemmtorf in der Nähe von Kasten und nördl. des Sees.) Pflanze verschwindet und taucht wieder an anderen Stellen auf. Feuchtigkeitsfordernd.
- (*B. cernuus* L., Nickender Z., erst südl. von Mondsee, Schafberggebiet.)
- Galinsoga parviflora* Cavan. (Gängelkraut). Im Einwandern begriffen. Erstes Exemplar 12. 9. 1927 auf d. Bahndamm.
- Dahlia variabilis* Desf. (Georgine). Verschiedene häufige Sorten in Wurz- u. Vorgärten.
- Cosmos bipinnatus* Cav. (Schmuckblume). Vorgärten, dringt allmählich in die Wurzgärten ein.
- Tagetes patula* u. *T. erecta* L. (Totenblume), wie C. b.
- Calliopsis bicolor* Rehb. (Mädchenauge). Gärten.
- Anthemis arvensis* L. (Feld-Kamille). „S'kloane Hummelbleaml“. Äußerst verbreitetes Wiesen- u. Ackerunkraut.
- A. cotula* L. (Stinkende Hundskamille). Von Norden her (Bahn) mäßig einwandernd.
- Santolina chamaecyparissus* L. (Zypressenähnl. Heiligenkraut). Friedhof.
- Achillea millefolium* L. (Gem. Schafgarbe). „Himmelsloaterln“ (Blätter!). Äußerst verbr. Weiße und rosafarbene Formen, letztere in höheren Lagen vorherrschend. Verwendung als Heilmittel (Tee): rote Blüten für Frauen, weiße für Männer.
- Matricaria chamomilla* L. (Echte Kamille). Wurzgärten in Oberhofen, in Zell nur in einem Haus gefunden. Heilmittel gegen Verdauungsstörungen.
- M. inodora* L. (Geruchlose K.). Vom Bahndamm nach Süden, sehr zerstr.
- (*M. discoidea* DC., Strahllose K., befindet sich auf ihren in den letzten Jahren auffallenden Wanderungen bereits in Straßwalchen, Bahnnähe.)
- Chrysanthemum vulgare* (L.) Bernh. (Rainfarn). Wurzgärten, zerstr. Verwendung als Heilmittel für Pferde. „Roßkamille“.
- C. leucanthemum* L. (Gem. Wucherblume). „Großes Hummelbleaml“. Äußerst verbr. in den Wiesen und deren benachbarten Assoziationen. Oft sehr große Formen.
- C. parthenium* Pers. (Mutterkraut). Verbr. in Wurzgärten; als „Brosenkraut“ (Absud) für Pferde ein Heilmittel.
- Artemisia abrotanum* L. (Eberreis). „Orukn“ (Anriecken). Verbr. in Wurzgärten. Nach Wimmer in den Wurzgärten Reste mittelalterlichen Anbaues. (Weihrauchersatz.)
- A. absinthium* L. (Wermut). In Wurzgärten verbreitet. Als Heilkraut bekannt. Selten verwildert.
- A. vulgaris* L. (Gem. Beifuß). September 1927 auf einem Sandbruche (Flyschschutt) beim Ramsauer. Äußerst selten.
- Tussilago farfara* L. (Huflattich). Äußerst verbreitet an feuchten Stellen, bes. in lichterem Waldteilen.
- Petasites albus* (L.) Gärt. (Weiße Pestwurz). „Weiße Wurz“. Vereinzelte Fundorte auf den östl. H., doch sehr verbreitet auf den westl. H. (Hasenkopf.) Feuchtigkeitsfordernd.

- P. hybridus* (L.) G. M. (Gem. P.). „Rote Wurz“. Äußerst verbreitet an den meisten Wasserläufen, bes. in niederen Lagen. Feuchtigkeitsfordernd.
- Arnica montana* L. (Wohlverleih). Verbreitet auf beiden H. Waldwiesen mit kalkfreiem Boden in mittleren und höheren Lagen. Wundheilmittel.
- Senecio vulgaris* L. (Gem. Kreuzkraut). Ziemlich verbr. auf Brachen und Äckern. Nach Angabe der Bauern erst vor ungefähr 30 Jahren in die Gegend gekommen.
- S. silvaticus* L. (Wald-K.). Selten. 1. Südosthang des Irrsberges. 2. Hochalm.
- S. viscosus* L. (Klebriges K.). Sehr selten. Bahndamm (Schotter).
- S. rupestris* W. K. (Felsen-K.). Äußerst selten vor Harpoint. Kalk bevorzugend.
- S. Fuchsii* Gmel. (Schmalblättriges K.). Äußerst verbr. in den Wäldern beider H., stellenweise den ganzen Unterwuchs beherrschend.
- S. nemorensis* L. (Hain-K.). Nur ein Fundort: Langat (Wald nordwärts des Sees). Feuchtigkeitsl. (1929: Heißig).
- S. paludosus* L. (Sumpf-K.). Äußerst verbr. im *Senecio-Phragmitetum*. Feuchtigkeitsfordernd.
- (*S. paluster* D. C., Moor-K., als *Cineraria palustris* in der Schulchronik vermerkt, doch sicher fehlend, zweifellos Verwechslung mit *S. paludosus*.)
- (*S. abrotanifolius* L., Bärenkraut, erst in der Gegend von Wartenfels, Schober.)
- Calendula officinalis* L. (Ringelblume). Neuestens in Vor- u. Wurzgärten sehr verbr. (Einmal eingesetzt, wuchert diese Pflanze unkrautartig.)
- Carlina acaulis* L. (Wetterdistel). An trockenen, sonnigen Hängen: Harpoint und Irrsberg, sehr zerstreut. (Als Wetterprophet in den Fenstern.)
- (*C. vulgaris* L., Gem. Eberwurz, erst jenseits des Westkammes.)
- Arctium lappa* L. (Gem. Klette). Sehr zerstreut, Gebüsche. Nähe der Fischerhütte.
- (*A. tomentosum* Mill., Wollige K., erst südwärts von Mondsee.)
- A. minus* (Hill) Bernh. (Kleine K.). Zerstr. in der Gegend von Oberhofen.
- Carduus acanthoides* L. (Weg-Distel). Zerstr. nördl. von Oberhofen; im Hauptteile des u. G. fehlend.
- (*C. defloratus* L., Alpen-D., fehlt. Kommt erst südlich des u. G. bei Wartenfels und gegen Fuschl zu vor.)
- Cirsium oleraceum* Scop. (Kohldistel). „Saure Stoankn“. Äußerst verbr. Leitpflanze. Feuchtigkeitsfordernd.
- C. arvense* (L.) Scop. (Feld-Kratzdistel). Äußerst verbr., bes. in Haferfeldern.
- C. lanceolatum* Scop. (Lanzenblättrige K.). Zerstr., nur auf der Hochalpe. Bodenvag. (1929: an versch. Stellen d. östl. H.)
- C. palustre* (L.) Scop. (Sumpf-K.). Äußerst verbr. an feuchten Waldstellen beider H.
- (*C. eriophorum* Scop., Wollköpfige K., erst hinter Wartenfels, Schober.)
- C. rivulare* (Jacqu.) All. (Bach-K.). Äußerst verbr., bes. in den Wiesen von Unterschwand und in den Sumpfwiesen nördl. des Sees. „Binder-schlögl“. Feuchtigkeitsl.
- Silybum Marianum* Gärt. (Mariendistel). Äußerst selten. Ephemer? Schuttstelle bei Wegdorf.
- Centaurea cyanus* L. (Kornblume). Sehr verbreitetes Ackerunkraut.
- C. jacea* L. (Gem. Flockenblume). „Eisenstankn“. (Man denke an den bastreichen Stengel!) Leitpflanze. Äußerst verbr. auf Wiesen und in deren benachbarten Assoziationen.
- C. scabiosa* L., (Grindkraut-F.). Zerstr. von Norden her gegen Unterschwand zu.

- C. montana* L. (Berg-F.). Nur ein Fundort: Oberlauf des Hausstätterbaches. Äußerst selten. Kalkliebend.
- Cichorium intybus* L. (Gem. Zichorie). Von Norden her auf der Straße und in deren Nähe gegen Wegdorf zu vordringend. Zerstr. Im Zentrum u. Süden des u. G. fehlend. Kalkliebend.
- C. endivia* L. (Endivie). In wenigen Gärten Zells u. d. Haslau kultiviert.
- Lapsana communis* L. (Rainkohl). Verbreitetes Unkraut, bes. im Lein.
- Aposotis foetida* (L.) Less. (Stinkkohl). Verbr. auf dem Kolomann und von da gegen Süden. Kalk bevorzugend.
- Hypochaeris radicata* L. (Ferkelkraut). Selten. Lackenberg. Kalkfliehend.
- Leontodon autumnalis* L. (Herbst-Löwenzahn). Sehr verbr. auf den Wiesen. Viele, durch mancherlei Übergänge verbundene Formen.
- L. danubialis* Jacq. (Gem. L.). Äußerst verbr., die häufigste L.-Art der Mischwiesen.
- L. hispidus* Neilr. (Kurzhaariger L.). Zwischen Guggenberg und Mondsee nach S. F. zerstreut, verbr. nordwärts des Sees.
- Tragopogon orientalis* L. (Gem. Bocksbart). Verbr. auf den Wiesen. (Scorzonera-Arten, Schwarzwurzel, fehlen.)
- Taraxacum officinale* L. (Gem. Kuhblume). „Moableaml“, „Moadistel“, „Saubleaml“. La. Sehr verbr. „Milibletschn“.
- Cicerbita muralis* Wallr. (Mauerlattich). Sehr verbr. 1. Mauerwerk der verbauten Bäche in Zell. 2. Gemeine Waldpflanze.
- Sonchus arvensis* L. (Acker-Gänsedistel). Verbr. Äcker. „Saudistel“.
- S. asper* (L.) Hill (Rauhe G.). Ziemlich verbr. Wüste Plätze.
- Lactuca sativa* L. (Kopfsalat). Gärten.
- Prenanthes purpurea* L. (Hasenlattich). Äußerst verbr. in den Mischwaldbeständen.
- Crepis aurea* (L.) Cass. (Goldgelber Pippau). Osthänge, Gegend von Harpoint.
- C. paludosa* (L.) Mnh. (Sumpf-Pippau). Verbr. An feuchten Stellen vor dem Walde und im Walde oft große Herden.
- C. biennis* L., (Zweijähriger P.). Sehr verbr. auf feuchten Wiesen.
- (*C. blattaroides* (L.) Will., Schabenkrautartiger P., 1925 eine Pflanze auf dem Kolomann gefunden. Im Schaffberggebiet nicht selten.)
- Hieracium pilosella* L. (Dukatenröschen). In mittleren und höheren Lagen beider H. verbr.
- H.* (Habichtskraut) aus der Art *H. silvaticum* der Autoren (*murorum* L.). Vorzugsweise verbr. in den Mischwäldern. Mannigfaltige, schwer zu unterscheidende Formen.
- H. sabaudum* L. (Savojer H.). Selten, Zellerbach in mittl. Lagen.
- H. umbellatum* L. (Doldiges H.). Selten. Westl. H. Seit 1929 in Herden beim „Hain“.

Monocotyledones.

Potamogetonaceae.

- Potamogeton alpinus* Balbis (Alpen-Laichkraut). Langsam fließende Gewässer nördl. des Sees.
- P. pusillus* L. var. *Bercholdi* Aschers. (Kleines L.). Gräben in Seenähe, zerstreut. 1927 auch im See. Von D. wird sp. *tenuissimus* Neilr. für den Zellersee angegeben.
- (*P. filiformis* Pers., Fadenf. L., fehlt im u. G. Fuschlsee.)
- P. crispus* L. (Hechtkraut). Im See erst 1928 gefunden.

- P. lucens* L., var. vulg. Cham. (Glänzendes L.). Äußerst verbr. im See, dringt von den *P.*-Arten am weitesten in den See hinaus.
 (*P. praelongus* Wulf., Langblättriges L., fehlt im u. G. Wolfgangsee. E. R.)
(P. densus L., Dichtblättriges L., fehlt im eigentlichen u. G.; in langsam fließenden Nebengewässern der Griesler Ache gefunden. Von D. auch für den Irrsee angegeben.)
P. natans L. var. vulg. Koch et Ziz (Schwimmendes L.). Verbr. im See.
P. fluitans Roth (Flutendes L.). Selten im See. Dr. St.
P. perfoliatus L. (Durchwachsenes L.). Äußerst verbreitet im See.
P. trichoides Cham. et Schlecht. (Haarf. L.). Selten. Nur einmal in einem Tümpel im Unterschwander Hölzl gefunden.
(P. pectinatus L., Kammf. Laichkraut, fehlt.)
(Zannichellia pal. L., Teichfaden, fehlt im u. G. Nach Hi. beim Guggenbergkeller bei Mondsee.)

Juncaginaceae.

- Triglochin palustris* L. (Sumpf-Dreizack). Zerstr. 3 Fundstellen (teilweise überflutete, geneigte Wiesenpartien): 1. Westwärts der Försterei von Oberhofen. 2. Nördl. d. Epplbauern. 3. Weg zum Neuhäusel. Immer in großen Herden. (1929: verbreitet sich immer mehr).
(Scheuchzeria palustris L., Blumenbinse, fehlt, Edtinger Moos verbr.)

Alismataceae.

- Alisma plantago* (L.) Michalet, subsp. *euplantago* Hegi, var. *latifolium* Kunth, f. *aquaticum* (Froschlöffel). Verbr. 1. Wasserläufe der östl. H. 2. Wasserläufe im Moore III usw.
 (Alle *Hydrocharitaceae*, Froschbißgewächse, fehlen, ebenso *Butomus umbellatus* L., Gemeine Wasserviole.)

Sparganiaceae.

- Sparganium erectum* L. subsp. *polyedrum* Aschers. et Graebn. (Aufrechter Igelkolben). „Bemesen“. Verbr. 1. Sumpfwiesen nördl. des Sees. 2. Seebucht vor Wildenegg. 3. Teich beim Gommersberger.
 (In der Fuschler Gegend S. e. subsp. *neglectum*.)

Typhaceae.

- Typha latifolia* L. (Breitblättriger Rohrkolben). „Bindabos“ (Binderbast). Zerstreut. 1. Zenzlbauer südl. d. Sees. 2. „Schlod“, Haslau. 3. Teich beim Haberl, Zell. 4. Moosmühle nördl. v. Zell. Die Blätter bilden ein vorzügliches Mittel zum Ausstopfen der Fässer und Boote. Wurde leider immer mit der Wurzel ausgerissen, daher im See ausgerottet.
(T. angustifolia L., Schmalblättriger R., fehlt.)

Araceae.

- Acorus calamus* L. (Kalmus). Durch Kräuter- und Wurzelsammler fast ausgerottet. Erst im 4. u. 5. Beobachtungsjahre nach mühseligem Suchen zwei mäßige Vorkommen entdeckt: 1. Beim Lederbauer auf dem Südwesthang des Mondseebirges. 2. Mitten in den Schilfbeständen am Seeufer unterhalb des Moosmüllers.

- Arum maculatum* L. (Aronstab). Verbr. Hasenkopf, Unterschwander Hölzl usw. An kalkreichen feuchten Stellen im Mischwalde.
 (*Calla palustris* L., Drachenwurz, fehlt im u. G.. Nächster Fundort nach Hi., Schulrat Naderer und Dr. Angerer: Auholz nordwärts von St. Lorenz.)

L e m n a c e a e.

- (*Lemna minor* L., Gemeine Wasserlinse, fehlt im u. G., ebenso *L. gibba* L., Bauchige W.; erstere zunächst in Schleedorf, oberhalb Weng, gefunden, letztere wird von E. R. für Mondsee angegeben.)
L. trisulca L. (Untergetauchte W.). In einem Tümpel in der Nähe von Mondsee.

G r a m i n e a e.

- Typhoides arundinacea* (L.) Mch. (Gemeines Bandgras). Sehr verbreitet in den Sumpfwiesen nördlich des Sees am Rande der Gewässer und in der Nähe des Seeufers in Unterschwand.
 (T. a. f. *picta* vor dem Neuhäusel. Zweifellos ausgesetzt.)
Anthoxanthum odoratum L. (Ruchgras): Sehr verbreitet, besonders auffallend in den Moorbiesen vor dem Moore III.
Milium effusum L. (Fluttergras). Zerstreut in lichten Bergwäldern der östl. H. (Lackerberg).
Phleum pratense L. (Wiesenlieschgras). Sehr verbreitet: Wiesen, offene Waldplätze, an Wegen und Ackerrändern.
Alopecurus pratense L. (Wiesen-Fuchsschwanz). Zerstreut, hie und da größere Bestände bildend, dann streckenweise ganz auslassend. (In Haslau großer Bestand auf sehr feuchtem Grunde: viele gekniete Formen, 1926.)
Agrostis alba L. (Weißlicher Windhalm). Verbreitet an Gräben, besonders vor Harpoint. Als f. *stolonifera* in manchen Teichen.
A. tenuis Sibth. (Gemeiner W.). Äußerst verbreitetes Wiesengras.
Apera spica venti (L.), Beauv. (Gemeine Windfahne). Zerstreut in Äckern.
Calamagrostis villosa Mutel (Glattes Rohrgras). Zerstreut auf den östl. H. (Koglerberg); besonders in der Nähe des Vaccinietums. Feuchtschattige Hänge auf Silikatboden.
C. epigeios (L.) Roth (Rohrartiges R.). Östliche H. an feuchten Waldrändern. Zerstreut.
Holcus lanatus L. (Wolliges Honiggras). Äußerst verbreitet.
Aira caryophylla L. (Nelkenhafer). Zerstreut an Wegrändern der Osthänge. S. F. Kalkfliehend.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. (Schlängelige Schmieie). Äußerst verbreitet, kalkfliehend, auf kieselhaltigem Substrat sehr häufig.
D. caespitosa (L.) Beauv. (Rasige Sch.). Auf feuchten Wiesen in Wald-, Au- und Buschnähe sehr verbreitet, besonders Irrsberg und Koglerberg.
Trisetum flavescens (L.) R. et Sch. (Goldhafer). Sehr verbreitetes Wiesengras.
Avena sativa L. (Futterhafer). Siehe Kultur!
Avenastrum pubescens Jess. (Kurzhaariger Wiesenhafer). Zerstreut in den Wiesen der niederen Lagen.
A. pratense (L.) Jess. (Kahler W.). Zerstreut. Wiesen südlich von Zell.
Arrhenatherum elatius Mert. et Koch (Glatthafer). Verbreitet. Bei Unterschwand 1926 versuchsweise gesät.
Sesleria uliginosa Opiz (Sumpf-Elfengras). Verbreitet in den Sumpfwiesen nördl. d. Sees.

- Phragmites communis* Trin. (Schilfrohr). „Schiefer“. Verbreitung: siehe Phragmitetum. Als Streu und jung als Pferdefutter verwendet.
- Sieglingia decumbens* (L.) Bernh. (Dreizahn). Verbr. in allen Lagen. An trockenen Teilen der östl. H. häufig.
- (*Melica nutans* L. u. *M. uniflora*, Retz., Perlgras, fehlt.)
- Molinia coerulea* (L.) Mnch. (Blaues Pfeifengras). Leitpflanze. „Schmähern“. (Mit diesem Ausdrucke werden allerdings auch andere hohe Gräser bezeichnet.) Äußerst verbr., feuchtigkeitsl.
- M. arundinacea* Schr. (Rohrartiges Pf.). Selten: im Teich nördl. Zell, Hasenkopf.
- Briza media* L. (Zittergras). „Frauenhaar“. Verbreitetes Wiesengras, bes. auf etwas trockeneren Hängen.
- Dactylis glomerata* L. (Knäuelgras). Äußerst verbr.
- Cynosurus cristatus* L. (Kammgras). Äußerst verbr.
- Poa annua* L. (Einjähriges Rispengras). Verbr. auf ungepflegtem Boden, bes. in Hausnähe, in Wurzgärten und auf Kartoffeläckern.
- P. nemoralis* L. (Hain-R.). Zerstr. in lichten Waldteilen.
- P. pratensis* L. (Wiesen-R.). Nur zerstr., weil trockenen Wiesengrund mit lockerem Boden liebend.
- P. trivialis* L. (Gemeines R.). Zerstr. Von der Bahn aus gegen Zell immer seltener werdend.
- (*Poa bulbosa* L., Knolliges R., fehlt. Sonnige Hügel bei Neumarkt. Hi.)
- Glyceria plicata* Fries (Gefaltetes Süßgras). Äußerst verbr. an den meisten quelligen, etwas besonnten Stellen.
- G. fluitans* R. Br. (Flutendes S.). Teile der Ache ausfüllend.
- Festuca heterophylla* Lam. (Verschiedenblättriger Schwingel). Verbr. am Waldrande in höheren Lagen.
- F. elatior* L. (Wiesen-S.). Zerstr. Wiesen der westl. H.
- F. arundinacea* Schr. (Rohrartiger S.). Verbr. in Seenähe.
- F. gigantea* (L.) Vill. (Riesen-S.). Selten auf den östl. H.
- Bromus erectus* Huds. (Aufrechte Trespe). Sehr selten.
- (*B. tectorum* L., Dachtrespe, nicht gefunden.)
- B. asper* Murr. (Rauhhaarige T.). Verbr.: Irrsberg, Lackerberg, Mischwälder. (Buchenbegleiter.)
- B. ramosus* Huds. (Ästige T.). Ziemlich verbr. in Gebüsch, an Feldrändern.
- B. sterilis* L. (Taube T.). Sehr selten: Bahndamm.
- B. secalinus* L. (Roggen-T.). „Durcht“. Häuf. Ackerunkraut.
- B. mollis* L. (Weichhaarige T.). Von Norden her sehr zerstr.
- Brachypodium silvaticum* (Huds.) R. et Sch. (Wald-Zwenke). Sehr verbr. in den Wäldern.
- (*B. pinnatum* (L.) Beauv., Gemeine Z., scheint zu fehlen.)
- Nardus stricta* L. (Hirschhaar). „Bettelbart“. Sehr verbr. auf den trockeneren Waldwiesen der östl. H. Steigt bis zum See hinunter.
- Lolium temulentum* L. (Taumellolch). „Haferwindel“. Verbreitetes Haferunkraut.
- L. remotum* Schrank (Lockerblütiger Lolch). „Haarschwindel“. Flachselder.
- L. perenne* L. (Gemeiner L.). Äußerst verbr., bes. Ackerränder.
- Agriopyrum repens* Beauv. (Gemeine Quecke). Zerstreut, gewöhnlich an Feldrainen.
- Secale cereale* L. (Roggen). In Zell nur Winterroggen, im Oberhofner Gebiet hie und da auch Sommerroggen (Sommerkorn).
- Triticum aestivum* L. (Weizen). Allgemein gebaut.
- Hordeum distichon* L. (Zweizeilige Gerste). Gebaut.

- H. murinum* L. (Mäusegerste). Zerstr.
H. europaeum (L.) All. (Wald-G.). Verbr. Wälder beider H.
 (Zea mays L., Mais, fehlt, ost- u. westwärts d. u. G. im kleinen gebaut.)

Juncaceae.

- Juncus glaucus* Ehrh. (Seegrüne Simse). Verbr. Feuchte Stellen.
J. compressus Jacqu. (Zusammengedr. S.). Verbr., feuchte St. Wegränder.
J. effusus L. (Gemeine S.). Das eigentliche „Binsenkraut“. „Saures Gras“.
 (Wie viele Carices.) Äußerst verbr., nasse Wiesen usw.
J. conglomeratus L. (Geknäuelte S.). Zerstr. Feuchte St.
J. filiformis L. (Fädliche S.). Großer Bestand beim Moor I.
J. bufonius L. (Kröten-S.). Verbr. an sehr nassen Stellen.
J. lampocarpus Ehrh. (Glieder-S.). Überaus verbr., Leitpflanze. In allen Gräben, längs der Wege. Nördl. des Sees J. l. var. *litorella*, f. *stolonifer*, vereinzelt mit Laubbüschem, hervorgerufen durch die Larven von *Livia juncorum*. (Ebenso auf einer feuchten Wiese auf dem Lichtenberg.)
Luzula pilosa (L.) Willd. (Haarige Hainsimse). Sehr verbreitet: allenthalben in der Zeller Gegend, Hain beim Bad, Vorzone des Moores I usw.
L. silvatica Gaud. (Große H.). Äußerst verbreitet an nassen Waldstellen beider H. Auf dem Wege zur Hochalm eine Form mit beiderseits scharf abgegrenzt braun beränderten Blättern.
L. campestris (L.) D. C. (Gemeine H.). Sehr verbreitet in manchen Wiesen.
L. nemorosa E. Mey. (Weißliche H.). Verbreitet in den Wäldern beider H.

Cyperaceae.

- Cyperus flavescens* L. (Gelbliches Cypergras). Zerstreut nördl. des Sees und Wiesen von Unterschwand. Auf sehr magerem Boden, Wegrand.
C. fuscus L. (Schwärzliches C.). Sehr selten in der Nähe des Nordwestwinkels des Sees und nördlich von Unterschwand.
Eriophorum vaginatum L. (Scheidiges Wollgras). „Weiße Mull“. Sehr verbreitet im Moore I.
E. angustifolium Roth (Schmalblättriges W.). Äußerst verbreitet: Moor I, Wiesen vor Harpoint, Sumpfwiesen nördl. des Sees, Bestände zwischen Unterschwand und Zell.
E. latifolium Hoppe (Breitblättriges W.). Bildet Wollgraswiesen auf beiden Hängen, so oberhalb Haubner, oberhalb des Epplbauern usw. Sehr verbreitet.
Trichophorum alpinum Pers. (Haarbinse). Sehr verbreitet im Moore I, Flachmoore nordwärts des Sees.
Schoenoplectus lacustris (L.) Pallas (Teichbinse). Äußerst verbreitet, neben *Phragmites comm.* die wichtigste Seepflanze.
Scirpus silvaticus L. (Graben-Binse). Äußerst verbr. auf nassen Wiesenstellen, quelligen Waldstellen.
S. maritimus L. (Meer-B.). Zerstr. zwischen Zellersee u. Kasten (Achennähe). S. F.
S. triqueter Roth (Dreikantige B.). Zerstr. in Seenähe.
Heleocharis palustris (L.) R. Br. (Sumpfriet). Zerstr., doch dann in Herden. Weg zum Neuhäusel. Vor Haslau.
 (H. uniglumis Schult., Grasgrünes S., Mondseer Gegend. E. R.)
Blysmus compressus (L.) Panz. (Quellriet). Auf feuchten Wiesen nördl. des Sees verbr. (Die letzten Jahre nicht mehr gefunden.)

- Schoenus nigricans* L. (Schwärzliche Knopfbirse). Große Bestände nördl. d. Sees.
- Rhynchospora alba* (L.) Vahl (Weiße Schnabelbinse). Äußerst verbr. in den Hoch- u. Flachmooren.
- Carex dioica* L. (Zweihäusige Segge). Zerstr. in den Mooren.
- C. Davalliana* Sm. (Rauhe S.). Verbr. Sumpfige Bestände.
- C. pulicaris* L. (Floh-S.). Von D. angegeben; fraglich, ob noch vorkommend.
- C. divulsa* Good. (Grüne S.). Zerstr. nördl. von Wegdorf.
- C. paniculata* L. (Rispige S.). Häufig in den „sauren“ Wiesen.
- C. pauciflora* Lightf. (Armlütige S.). Selten im Moor I zwischen Sphagna-beständen. Dr. Z.
- C. brizoides* L. (Zittergrasartige S.). Äußerst verbr. „Rasch“. C. b. wird getrocknet, zusammengedreht und als „Terrestrisches Seegras“ versandt.
- C. vulpina* L. (Fuchs-S.). Verbr. zwischen Unterschwand u. Zell.
- C. leporina* L. (Hasen-S.). Zerstr. Moor II.
- C. disticha* Huds. (Zweizeilige S.). Zerstreut in den Flachmooren.
- C. stellulata* Good. (Stachelige S.). Verbr. Moor I u. nördl. d. Sees.
- C. elongata* L. (Verlängerte S.). Zerstr. Lackerberg. S. F.
- C. gracilis* Curt. (Scharfkantige S.). Verbr. Flachmoore.
- C. Goodenovii* Gay (Gemeine S.). Äußerst verbr.
- C. limosa* L. (Schlamm-S.). Von D. angeführt. Fraglich, ob noch vorkommend.
- C. flacca* Scop. (Seegrüne S.). Verbr. Feuchte Waldstellen.
- C. pallescens* L. (Bleiche S.). Verbr. Graben d. Moores II.
- C. digitata* L. (Fingerf. S.). Selten. Früher im Zigeunerhölzl.
- C. pendula* Huds. (Überhängende S.). Zerstreut in den Wäldern beider H. Sehr große Formen.
- C. silvatica* Huds. (Wald-S.). Äußerst verbreitet. Buchenbegleiter bis tief in die gemischten Bestände hinein.
- C. flava* (L.) Tausch (Gemeine gelbe S.). Auf Flachmooren, nassen Waldwiesen und nassen Wegrändern, an Wasserläufen sehr verbreitet.
- C. Oederi* Retz. (Kleine gelbe S.). Sehr verbreitet in Sumpfwiesen nördlich des Sees und an feuchten Stellen des Kolomanns.
- C. rostrata* Stok. (Geschnäbelte S.). Moor I, Flachmoore nördlich des Sees.
- C. lasiocarpa* Ehrh. (Behaartfrüchtige S.). Verbreitet. Flachmoore nördl. des Sees.
- C. riparia* Curt. (Ufer-S.). Zerstreut in den Flachmooren nördl. des Sees.
- C. vesicaria* L. (Blasen-S.). In den Wassergräben von Zell und Unterschwand verbreitet.
- C. Hornschuchiana* Hoppe (Host's S.). Flachmoore zwischen Unterschwand und Zell.
- C. panicea* L. (Hirse-S.). Verbreitung wie C. H.
- C. distans* L. (Entferntährige S.). Verbreitet auf den Sumpfwiesen von Zell und Unterschwand.
- C. remota* L. (Schlafe S.). Äußerst verbreitet vom See die Berge aufwärts, besonders in den Mischwäldern und meist gesellig mit *C. brizoides*.
- C. acutiformis* Ehrh. (Sumpf-S.). In den Sümpfen nördl. des Sees den Hauptbestandteil des Magnocaricetums längs der Wasserläufe bildend; äußerst verbreitet auch in der Gegend von Unterschwand.
- C. stricta* Good. (Steife S.). Sehr verbreitet in Flachmoorbständen; südwärts des Sees, an der Ache.
- (*C. caespitosa* L., Rasige S., nicht gefunden. Von E. R. für die Mondseer Gegend angeführt.)

Liliaceae.

Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg. (Graslilie). Äußerst verbreitet, konstanter Begleiter kleiner Entwässerungsgräben. Unterschwand, nördl. des Sees, Harpoint. Gerne auf Kalk.

Colchicum autumnale L. (Herbstzeitlose). „Satlas“. „Lausbleaml“. La. (Absud gegen Schweineläuse.) Äußerst verbreitet, verursacht oft schwere Krankheiten und sogar Verenden der Rinder.

Hemerocallis fulva L. (Gelbrote Taglilie). Wurzgärten.

Gagea lutea (L.) Ker (Gelbstern). Sehr verbreitet auf den Wiesen in niederen Lagen. Kleinere Herden neben *Leucoium vernum*.

Allium schoenoprasum L. (Schnittlauch). Vor- und Wurzgärten; weil feuchtheitsliebend, stark überwuchernd.

A. ursinum L. (Bärenlauch). Äußerst verbreitet, weil viel Feuchtigkeit und Schatten liebend, besonders im Zellergraben und Hinterauergräben.

A. cepa L. (Sommerzwiebel). Weit weniger vom Bauer geschätzt und gebaut als *A. sativum*. In Oberhofen häufiger als in Zell.

A. porrum L. (Porre). In Zell ziemlich unbekannt, in Oberhofen in einigen Vorgärten.

A. sativum L. (Knoblauch). Wird viel gebaut.

Muscari racemosum (L.) Lam. et D. C. (Traubenhyazinthe). Hänge in der Gegend von Wildenegg. O. R.

Hyacinthus orientalis L. (Hyazinthe). Vorgärten.

Majanthemum bifolium (L.) Schm. (Schattenblume). Äußerst verbr. in den Wäldern beider H.

Polygonatum multiflorum (L.) All. (Vielblütiger Salomonssiegel). Von Süden her geschlossen fast durch das ganze u. G.

(*P. officinale* All., Gemeiner S., erst südwestl. von Mondsee.)

(*P. verticillatum* (L.) All., Quirlblättriger S., erst südlich von Wartenfels, dort sehr verbr.)

(*Convallaria majalis* L., Maiglöckchen. Zweifelhafte: H. d. Irrsberges.)

Paris quadrifolia L. (Einbeere). Sehr verbr.

Tulipa Gesneriana L. (Gartentulpe). Vorgärten.

Amaryllidaceae.

Galanthus nivalis L. (Schneeglöckchen). Nach Pf. S. nur nordwestl. von Oberhofen zerstr. Sonst fehlend.

Leucoium vernum L. (Frühlingsknotenblume). „Schneekatherl“. Äußerst verbr. in den Wiesen von Unterschwand u. Harpoint.

Narcissus pseudonarcissus L. (Märzenbecher). Wurzgärten. Jenseits d. Säurüsselhanges bei St. Georgen im Freien. S. B. (Vereinzelt)

(*Narcissus poeticus* L., Dichternarzisse, fehlt. Nach D.: St. Lorenz.)

Iridaceae.

Iris pseudacorus L. (Wasser-Schwertlilie). „Falscher Kalmus“. Sehr verbr., bes. in Seenähe u. an der Ache.

(*Crocus vernus* Wulf., Frühlingsafran, fehlt. Nach Hi. im Attergau.)

Orchidaceae.

Cypripedium calceolus L. (Frauenschuhe). Heute bereits fraglich. Nach Pf. S. vereinzelt: Langat, Harbringer Hölzl. Wird geschützt.

Orchis ustulata L. (Brandblütiges Knabenkraut). Von D. für Zell am Moos angeführt. Kalkliebend.

- O. morio* L. (Gemeines K.). Zerstr.: trockenere Stellen d. östl. H.
O. mascula L. (Stattliches K.). Zerstr., östl. H., kalkl.
O. maculata L. (Geflecktes K.). Verbr. auf beiden H.
O. latifolia L. (Breitblättriges K.). Verbr., bes. auf den westl. H.
 (O. *pallens* L., Bleiches K., wahrscheinlich übersehen.)
Gymnadenia conopea (L.) R. Br. (Gem. Friggagras). Äußerst verbr., bes. auf den östl. H., vorwiegend zwischen *Eriophorum* und *Phragmites*. Zieht kalkreichere Unterlagen vor.
G. odoratissima (L.) Rich. (Wohlriechendes F.). Zerstr. im Vorgebiete des Moores I.
 (Herminium *monorchis* (L.) R. Br., Herminie, fehlt. Nach Hi. Mondsee, Talgau.)
Plantanthera bifolia Rich. (Weiße Waldhyazinthe). Zieml. verbr. in der Nähe der Wasserscheide nördl. des Sees.
Cephalanthera rubra (L.) Rich. u. *C. alba* (Cr.) Si., Rotes und Weißes Waldvöglein, fehlen.)
Epipactis latifolia (L.) All. (Breitblättriger Sumpfstendel). Ziemlich verbr. (Osthang des Irrsberges gegen die Ebene zu, Wäldchen im Becken vor Mondsee, den Zellerbach aufwärts usw.)
E. atropurpurea Rafin. (Braunroter S.). Sehr selten auf dem Kolomann und in einem Gebüsch östl. des Nordostwinkels des Sees. (Sehr verbreitet im Schobergebiet.) Bes. auf Kalk.
E. palustris (L.) Cr. (Gem. S.). Äußerst verbr., insbesondere im *Phragmitetum*, ferner in den Quertälern der östl. H.
Spiranthes aestivalis (Lam.) Rich. (Drehähre). Nur zwei Fundorte: 1. An der Grenze der Sumpfwiesen nördl. des Sees, dort truppweise. 2. Auf den feuchten Wiesen des Lichtenberges.
Listera ovata (L.) R. Br. (Eirundblättriges Zweiblatt). Sehr verbr. in den feuchten Wiesen zwischen Unterschwand und Zell und in den Mischwäldern der westl. H., bes. auf dem Kolomann. Feuchtigkeitsl.
L. cordata R. Br. (Herzbl. Zweiblatt). D. gibt L. c. für das u. G. an, ohne näher die Fundorte anzuführen. Fraglich, ob noch vorkommend.
Neottia nidus avis (L.) Rich. (Nestwurz). Ziemlich verbr. in den Mischwäldern, bes. auf den östl. H. an Stellen, wo die Buche vorherrscht. Häufig besonders in den Bauernwäldern, die nicht oder nur mangelhaft gepflegt werden.
Liparis Loeselii Rich. (Glanzwurz). Von D. ohne nähere Fundortsangabe für Zell am Moos angeführt. Fraglich, ob noch vorkommend.
 (Corallorrhiza *trifida* Châtelain, Korallenwurz, erst bei Talgau. Hi.)
 (Malaxis *paludosa* L., Weichwurz, fehlt. Nächster Fundort nach Hi. in Mattsee.)

Anhang: Bryophyta.

Die folgenden Moose wurden auf den Wanderungen des Verfassers mit Herrn Dir. Pius Fürst und manche auf den Wanderungen mit Herrn Dr. Hans Zumpfe gesammelt und fast ausschließlich von Herrn Dir. Fürst bestimmt;⁸⁰⁾

⁸⁰⁾ In der Aufzählung sind die Moose von Herrn Dir. P. Fürst zitiert nach Limpricht K. G., Die Laubmoose Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, und nach Müller K., Lebermoose Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Rabenhorst L., Kryptogamenflora (1890—1916).

die Arten, auf welche Herr Dr. Zumpfe aufmerksam machte, sind mit Dr. Z. bezeichnet.

Der Moosreichtum der Gegend findet seine Erklärung in dem Fehlen jener Faktoren, welche die Transpiration fördern: hohe Temperatur, geringer Wassergehalt der Luft, oft bewegte Luft.

Die Fundortsangaben zeigen den Ort, wo die betreffende Moosart, die dann zur Bestimmung kam, aufgelesen wurde; es ist natürlich im allgemeinen unmöglich, bei den Moosen eines bestimmten Gebietes alle Fundorte anzugeben, wie dies bei den Phanerogamen geschehen ist.

Musci.

Bryales.

Dicranaceae.

Pleuridium subulatum. Zell 560 m. (Ditrichaceae.)

Dichodontium pellucidum. Weg zur Kulmspitze 800 m. (Rhabdoweisiaceae.)

Dicranella cerviculata. Torfstich des Moores I.

D. heteromalla. Unterschwand, oberhalb des Ramsauers, Mondseeberg, Kulmspitze und Kolomannsberg; in Höhen über 800 m gewöhnlich.

D. rufescens. Lackerberg.

D. varia. Buchscharten 700 m.

Dicranum Bergeri. Moor I.

D. Bonjeani = palustre. Weg zum Moore I, Wiese auf dem Kolomannsberg 700 m.

D. flagellare. Moor I.

D. montanum. An Bäumen auf dem Saurüssel und Lackerberg 800 m.

D. scoparium. Westl. des Sees (650 m), auch sonst sehr gemein.

D. undulatum. Auf den nassen Wiesen und in den Mooren sehr verbr. Moor I, Saurüssel 700 m, Wiese auf dem Kolomannsberg 780 m.

Dicranodontium longirostre. Oberhalb der Ramsau, auf dem Saurüssel, auf dem Torfstiche im Moore I, Weg zum Kolomannsberg usw. Sehr häufig auf Strüngen und Gestein.

Seligeria recurvata. Hasenkopf, oberhalb des Ramsauers, Vöcklalauf bei Haslau usw. An Gestein. (Schizeriaceae.)

Leucobryaceae.

Leucobryum glaucum. Bei Hochmooransätzen im Walde. Lackerberg, Saurüssel, Moor I.

Fissidentaceae.

Fissidens adiantoides. An nassen und versumpften Stellen. Unterschwand, Buchscharten, Lackerberg.

F. decipiens. An trockenem, kalkigem Gestein in Buchscharten.

F. taxifolius. Ober der Ramsau; Haslau, Hochruck.

Pottiaceae.

Weisia viridula. Wald an der Straße in der Nähe Zells. 600 m.

Gymnostomum rupestre. Mondseeberg. 700 m.

Barbula unguiculata. Unterschwand.

Didymodon rubellus. Nahe der Straße Mondsee—Zell.

Tortula subulata. Zell, auf Erde.

Grimiaceae.

- Schistidium apocarpum*. Lackenberg, Mondseeberg, Kulmspitze. 700 — 800 m.
Racomitrium canescens. Saurüsselwald, Wiesenrand. 700 m.

Orthotrichaceae.

- Ulota crispula*. Wald oberhalb der Ramsau, 600 m.
Orthotrichum stramineum. Straßennähe und Wald oberhalb der Ramsau.
O. Lyellii. Straße von Zell, 560 m.
O. speciosum. Wie *O. L.*

Encalyptaceae.

- Encalypta ciliata*. Bei Zell, 600 m.
E. vulgaris. Buchscharten, 600 — 700 m.

Funariaceae.

- Funaria hygrometrica*. In Seenähe, besonders nördl. des Sees, Torfstich im Moore I.

Bryaceae.

- Webera elongata*. Kolomannsberg. 900 m.
Bryum pallens. Umgebung von Zell.
B. pseudotriquetrum. In den Gräben nördl. des Sees, in dem Straßengraben bei der Straße nach Haslau.
Mniobryum albicans. Buchscharten.

Mniaceae.

- Mnium affine*. Lackenberg und Kulmspitze, 800 m.
M. cuspidatum. Ramsauerbach, steinige Stellen, 600 m.
M. punctatum. Weg am See, 560 m.
M. serratum. Haslau und Hochruck, 600 m.
M. Seligeri. Sumpfwiesen nördl. des Sees.

Aulacomniaceae.

- Aulacomnium palustre*. Sehr häufig auf nassen Wiesen und in den Mooren nördl. des Sees. Moor I.

Bartramiaceae.

- Philonotis calcarea*. Unterschwand u. Straße nach Haslau. Kalkliebend.
P. fontana. Moor I. Kalkmeidend.

Diphysciaceae.

- Diphyscium sessile*. Lackenberg.

Georgiaceae.

- Georgia pellucida*. Häufig auf faulen Strünken im Saurüsselwald u. a. dem Lackenberg. Moor I.

Polytrichaceae.

- Catharinea Hausknechtii*. Wald beim Ramsauer. Seltenes Moos!
Polytrichum formosum = *P. attenuatum*. Unterschwander Hölzl, Kulmspitze u. Mondseerberg. 900 m.

P. gracile. Torfstich im Morre I.

P. strictum. Sehr verbr. auf Torfböden, bes. nördl. des Sees und auf dem Wege zum Moore I.

P. juniperum. Umgebung des Moores I. Dr. Z.

Fontinalaceae.

Fontinalis antipyretica. Ein Bächlein in Unterschwand fast ganz ausfüllend.

Climaciaceae.

Climacium dendroides. Sumpfwiesen nördl. des Sees, auch sonst sehr verbr. auf nassen Wiesen.

Leucodontaceae.

Leucodon sciuroides. An der Straße nach Zell, auf dem Wege zur Kulmspitze (800 m), an Bäumen häufig. (Charakteristisches Rindenmoos alter Bäume.)

Antitrichia curtipendula. Holzschlag an der Vöckla (600 m) u. an verschiedenen Stellen auf Obstbäumen.

Neckeraceae.

Neckera complanata. Buchscharten, 700 m.

N. pumila. An Bäumen ober der Ramsau, in Unterschwand und westl. des Sees.

N. crispa. Funde in den Pfahlbauten! (S. M.)

Lembophyllaceae.

Isoetecium myurum. Häufig an Stämmen ober der Ramsau (600 m) u. im Saurüsselwald (700 m).

Entodontaceae.

Pterigynandrum filiforme. Oberhalb der Ramsau, 600 m.

Leskeaceae.

Anomodon attenuatus. An der Straße nach Zell auf Holz u. Steinen.

Leskea nervosa. Auf Bäumen in Buchscharten.

Thuidium abietinum. Unterschwander Wiesen.

Th. Philiberti. Wäldchen ober d. Ramsau u. im Unterschwander Hölzl.

Th. tamariscinum. Wie *Th. Ph.*

Hypnaceae.

Amblystegium serpens. An der Unterschwander Kapelle u. Zeller Kirche.

A. filicinum. Straßengraben bei Zell (600 m), Wasserrinnen in Seenähe.

Scleropodium purum. Straße nach Haslau, Waldboden. (In den Mondseer Pfahlbauten; in der S. M. als *Hypnum purum* bezeichnet.) Wiesen.

Hypnum protensum. Ober der Ramsau, westl. des Sees auf Holz gefunden!

H. stellatum. Wasserrinnen beim See, überall in den sumpfigen Wiesen, bes. in den Moorwiesen nördl. des Sees, auf dem Saurüssel u. b. Moore I.

H. intermedium. Sumpfwiesen nördl. des Sees, Moor I, überhaupt verbr. an nassen Stellen.

H. uncinatum. Vöcklatal, 700 — 800 m.

- H. vernicosum*. Nörtl. des Sees, nasse Stellen. Kalkmeidend. *Fehlt bei Wien!*
H. commutatum. Wassergräben an der Straße (600 — 650 m), Buchscharten, Lackerberg, Saurüssel (Wiese) und nördl. des Sees. Kalkliebend.
H. falcatum. Wassergräben bei Zell. 650 m. Kalkliebend, häufig. (Auch Bachränder bei Guggenberg.)
H. crista-castrenses. Kulmspitze (900 m).
H. molluscum. Ober der Ramsau, 600 m. Kulmspitze, 900 m. Westl. des Sees: Hasenkopf, Kolomann. Kalkliebend.
H. cupressiforme. Sehr verbr., zählt zu den gemeinsten Moosen, bes. auf dem Lackerberg.
H. Lindbergii. Zell gegen den Lackerberg, Wegrand.
H. palustre. Ober der Ramsau, Weg nach Buchscharten und westl. des Sees. Kalkliebend, gerne an überrieselten Gesteinsstücken.
H. giganteum. Moor I. In tiefen Gräben u. Sümpfen.
H. stramineum. Moor I. Verbr. auf den Wiesen des Mondseeberges.
H. cuspidatum. Überall an sumpfigen Stellen, bes. nördl. des Sees.
Hylocomium loreum. Saurüsselwald, Lackerberg. Häufiger Bestandteil der Wiesenvegetation des u. G.
H. rugosum. Wiese auf dem Gommersberg; auf trockenen, kalkhaltigen Wiesen.
H. Schreberi. Verbr. auf allen Waldwiesen, so auf dem Saurüssel, Lackerberg usw. Auch nördl. d. Sees.
H. splendens. Überall häufig auf Waldböden u. in Wiesen.
H. squarrosum. Zeller Gegend, nasse Wiesen.
H. triquetrum. Verbr. an Wiesenrändern, Wald.
Eurhynchium piliferum. Ober der Ramsau u. auf dem Lackerberge. Waldboden.
E. striatum. Weg am Seeufer, Kulmspitze, nördl. des Sees. Auf Waldboden unter Büschen.
Plagiothecium pseudosilvaticum. Oberhalb der Ramsau u. westlich des Sees. (800 m).
P. silesiacum. Oberhalb der Ramsau, Saurüsselwald und westl. des Sees auf faulenden Strünken.
P. undulatum. Lackerberg, Kolomannsberg (800 m). Scheint im u. G. weit häufiger als in der Wiener Gegend zu sein.
Camptothecium lutescens. Häufig an grasigen Stellen und Wegrändern.
C. nitens. In den Sümpfen nördlich des See.

Hookeriaceae.

- Pterygophyllum lucens*. Im Vorgelände des Waldes der westl. H. (um 650 m herum.)

Brachytheciaceae.

- Brachythecium populeum*. An Stämmen oberhalb der Ramsau und auf dem Hasenkopf.
B. rivale. Straße nach Haslau u. Lackerberg. Nasse Stellen.
B. salebrosum. Zell, 600 m; Vöcklatal u. Haslau. Auf verschiedenem Substrat: Holz, Erde usw. *B. glareosum*. Feuchte Wiesen. Dr. Z.
B. rutabulum. Mondseeberg, auf Strünken.
B. velutinum. Westl. d. Sees. Unterschwander Hölzl.
Rhynchostegium murale. An feuchtem Gestein. Oberhalb der Ramsau (600 m), Kulmspitze (700 m) u. westl. d. Sees..

Sphagnales.**Sphagnaceae.**

- Sphagnum cymbifolium*. Wiesen u. Wald bei Unterschwand. Kolomannsberg (900 m), Moor I, Hochmooransätze nördl. d. Sees, Saurüsselwald.
S. medium = *S. magellanicum*. Hochruck (700 m), Unterschwand, Saurüssel, Kolomannsberg bis 900 m, Moor I.
S. subbicolor. Wiesen oberhalb des Unterschwander Hölzls.
S. acutifolium. Torfstich im Moore I, Vöcklatal.
S. fuscum. Sehr verbr. in allen Hochmooren und an feuchten Waldstellen (Hochmooransätzen).
S. Girgensohnii. In den meisten Wäldern. Saurüsselwald 800 m, Schoiber 600 m. Moor I.
S. quinquefarium. Saurüsselwald (800 m) u. in den oberen Waldpartien des Vöcklatales.
S. Russowii. Moor I, Saurüssel, Hochruck, Kolomannsberg (800 m).
S. subnitens. Waldige Hügel bei Zell.
S. Warnstorffii. Zieml. häufig in allen Sphagnumbeständen.
S. subsecundum. Westl. des Irrsees, Kolomannsberg bis 1000 m. Moor I.
S. squarrosum. Waldhänge im Vöcklatal bis 700 m.
S. cuspidatum. In allen Sphagnetis gefunden; *S. c. var. plumosum* in einem Kolke des Moores I.
S. parvifolium. Sehr verbr. Moor I, nördl. des Sees, Saurüssel.

Hepaticae.**Jungermanniales.****Acrogynaceae.**

- Lophozia barbata*. An Erdrutschungen in Zell.
Nowellia curvifolia. Oberhalb der Ramsau, Hasenkopf, Gschwander Hölzl, Saurüssel; auf Strünken und Moderholz.
Plagiochila asplenoides. Erdrutschungen in Zell. Waldboden.
Chiloscyphus polianthus var. rivularis. Im Bache an der Straße nach Haslau.
Pleuroschisma trilobatum. U. a. im Saurüsselwald, oft in Massenvegetation.
Blepharostoma trichophyllum. Ober der Ramsau, in Höhen bis 850 m. Auf Erde, Moderholz usw.
Diplophyllum albicans. Südende d. Sees bis zum Kolomannsberg, auf diesem bis 800 m. Auf Kalk fehlend o. selten.
Cephalozia bicuspidata. Saurüssel, Hasenkopf u. Kolomannsberg bis 800 m.
Calypogeia fissa. Vom See den Kolomannsberg aufwärts bis 800 m, auf dem Hochruck in 600 m Höhe.
C. trichomanoides. Saurüssel.
Lepidozia reptans. See — Kolomannsberg bis 800 m. See — Hasenkogel. Gerne auf Moderholz.
Ptilidium pulcherrimum. Kolomannsberg bis 900 m. Strünke, Nähe von Moor I.
Trichocolea tomentella, Saurüssel.
Scapania nemorosa. Westl. d. Sees.
Radula complanata. Lackenberg 900 m. Auf Rinde.
Frullania dillatata. Zell, Beckengrund, auf Rinde.
F. tamarisci. See — Kolomannsberg. Gestein.
Madotheca platyphylla. Unterschwander Hölzl. Dr. Z.

Bazzania trilobata. Wald vor Moor I. Dr. Z.

Mylia anomala. Moor I. Dr. Z.

Anacrogynaceae.

Metzgeria furcata. Oberhalb Ramsau (Bäume) 600 m.

Pellia epiphylla. Hasenkopf, Kolomannsberg, feuchte Stellen.

Marchantiales.

Marchantiaceae.

Marchantia polymorpha. Nördl. u. westl. des Sees an feuchten Stellen, ferner häufig vor dem Moore I.

III. Zusammenfassendes über die Vegetationsverhältnisse des Irrseebeckens.

Das Irrseebecken kann als artenarm angesprochen werden; vom Verfasser wurden hier 725 Arten (Pteridophyta und Anthophyta), darunter 620 wildwachsend, registriert; die Arteneinförmigkeit des Irrseebeckens bezieht sich nur auf die Anthophyta, während beispielsweise gerade die Bryophyta im u. G. eine große Artenentwicklung zeigen.

Von den fehlenden Pflanzen⁶¹⁾ soll immer dort gesprochen werden, wo der Verfasser glaubte, den Schwerpunkt aller Gründe, aus welchen sie das u. G. nicht besetzt halten, gefunden zu haben.

A. Die Abgeschlossenheit des u. G. bringt ein Fehlen vieler Arten mit sich, die in verkehrsreichen Gegenden, in Gebieten mit großen Flußläufen oder dort, wo eine Aufnahme in den bestehenden, mehr ursprünglichen Pflanzenbestand leichter möglich ist, schon lange festen Fuß gefaßt haben.

Der Zug der Berge, die sich der großen Plaike vorlagern, läßt Pflanzen von Westen her, die vielleicht im Beckengrunde oder auf den Wiesenhängen gedeihen könnten, kaum zu; der sonst geschlossene Wald, der sich im Westen nord-südwärts dehnt, erfährt wohl eine Unterbrechung beim Sommerholzer Sattel, doch westlich davon liegt das Neumarkter Gebiet, das einen ausgeprägten Vorstoß wärme- und trockenheitsliebender Pflanzen vorstellt. Manche Pflanzen, die der Neumarkter Gegend eigen sind, wie *Salvia pratensis*, *Silene nutans* usw., steigen wohl gegen Osten hin

⁶¹⁾ Der Verfasser bemühte sich, für die einzelnen Punkte der Zusammenfassung eine nach seinem Wissen ausführliche Liste von Beispielen aufzustellen; es ist ihm Raummangels halber nur gestattet, immer bloß wenige charakteristische Pflanzen seiner Listen anzuführen.

bis zur Sattelhöhe, können aber infolge der ganz anderen Standortbedingungen im u. G. in dieses nicht eindringen.

Das u. G. ist wohl nach Norden, gegen die ebenen Gebiete zu, geöffnet, von hier aus gegen Süden finden aber viele Pflanzen wegen der neuen Standortverhältnisse keinen Eingang oder wandern nur ein Stück in das u. G., wie *Medicago falcata* und *Cychorium intybus*. Im Osten hindert der breite, dichtbewaldete Zug des Saurüssels eine Einwanderung von dem in mancher Beziehung analogen Attergau; so sind beispielsweise die in letzterem häufigen Pflanzen *Geranium phaeum* und *Scilla bif.* noch nicht herübergelangen.

Die Schwierigkeit, ja fast Unmöglichkeit der Herwanderung aus dem südlichen Kalkgebiete soll an anderer Stelle eingehend erörtert werden.

Von den in Hayeks Pflanzengeographie⁶²⁾ angeführten (wichtigsten) Archaeophyten (uralte, aber doch fremde Siedler) vermissen wir im eigentlichen u. G. *Conium maculatum*, *Lamium amplexicaule*, *Hyoscyamus niger*, *Datura stramonium* u. *Carduus acanthoides*. Charakteristisch ist, daß alle bei Hayek angeführten Epökophyten (in neuer Zeit auftretende Fremdlinge) fehlen oder an der Grenze stehen geblieben sind, einschließlich der sechs Neophyten (neue, sich vollständig einbürgernde Fremdlinge) *Erigeron canadensis*, *Galinsoga parviflora*, *Matricaria discoidea*, *Oenothera biennis*, *Aster salicifolius*, *Solidago serotina*. Andererseits finden sich im u. G. sämtliche von Hayek dort angeführten Apophyten (einheimische Unkräuter), wie *Rumex obtusifolius*, *Urtica dioica* und so weiter.

Weit reichhaltiger als das u. G. sind solche Gebiete der Hügelsstufe besetzt, die von einem Flusse durchzogen sind, der von höheren Teilen mancherlei Pflanzenmaterial bringt oder längs dessen Talungen leicht Pflanzen aufwärts wandern.

Da das u. G. kein „Durchzugsgebiet“ ist, fehlen viele Arten, die sich sonst typisch „ephemer“ gebärden, wie *Ranunculus sceleratus*.

Die feuchtigkeitsliebenden Pflanzen haben feste Vereine (ein dichtes Wurzelgeflecht) gebildet und ein kräftiges Netz gezogen, das jedem Neuankömmling, fände er auch hier günstige Bedingungen, das Eindringen schwer oder unmöglich macht. „Die an den Standort bestangepaßten Pflanzen verdrängen die weniger gut angepaßten Arten immer mehr und mehr.“⁶³⁾ Besonders dicht und für einen eventuellen Neubesiedler fast unzugänglich sind die Bestände beim Wasser mit *Alisma plantago*, *Veronica beccabunga*,

⁶²⁾ Hayek A., Allgemeine Pflanzengeographie (1926) S. 277.

⁶³⁾ Scharfetter R., Österr. bot. Zeitschrift 6 (1909) S. 217.

Carex vesicaria, *Ranunculus flammula*, *Mentha aquatica* usw.; ferner die Bestände mit *Epilobium*-arten, *Cirsium oleraceum*, *Potentilla erecta*, *Succisa pratensis* (insbesondere also mit jenen Arten, die als „Leitpflanzen“ bezeichnet wurden) usw.; endlich die Bestände jener Arten, welche saure Wiesen bilden, wie die feuchtigkeitsfordernden *Carex*-arten, *Juncus*-, *Equisetum*-, *Eriophorum*-, *Cyperus*-arten usw.

So haben beispielsweise von den im übrigen Oberösterreich meist häufigen Arten das u. G. noch nicht erreicht, bezw. konnten nicht eindringen: *Hippuris vulgaris*, *Elodea canadensis*, *Trifolium fragiferum*, *Astragalus cicer*, *Sarothamnus scoparius*, *Impatiens parviflora*, *Mimulus guttatus*, *Sinapis alba*, *Erysimum repandum*, *E. cheiranthoides*, *Roripa silvestris*, *Diploaxis muralis*, *D. tenuifolia* Besonders auffallend ist das Fehlen anderer, in ähnlichen Gegenden so allgemein verbreiteter Kreuzblütler, wie *Lepidium draba*, *L. ruderale*, *Alliaria officinalis* usw. Der Botaniker vermißt ferner vor allem *Galium silvaticum*, *Moehringia trinervia*, *Geranium pratense*, *G. pyrenaicum*

B. Zum Teile aus den genannten Gründen — Abgeschlossenheit und extreme Standortverhältnisse — fehlen im u. G. folgerichtig Arten, die auch sonst in Oberösterreich oder Salzburg nur zerstreut vorkommen, wie *Stratiotis aloides*, *Festuca silvatica*, *Bromus inermis*, *Melica uniflora* . . .

C. Es fehlen wärme- oder trockenheitsliebende Pflanzen, die aber öfters noch in Gebieten mit ähnlichen Standortverhältnissen zu finden sind, wie *Acer campestre*, *Potentilla argentea*, *Erodium cicutaria*, ferner *Lathyrus niger*, *Aristolochia clematis*, *Delphinium consolida*

Insbesondere fehlen im u. G. jene wärme- und trockenheitsliebenden Pflanzen vollständig, die als pannonische (pontische) Elemente angesprochen werden und nicht so sehr wegen der Entfernung vom geschlossenen pannonischen Gebiete und seinen Ausstrahlungen, als vielmehr wegen der hiesigen klimatischen Verhältnisse unmöglich sind.

Es fehlen auch jene Pflanzen, die nicht direkt als Elemente der pontischen Flora angesehen werden, deren Verbreitungszentren aber in südlichen Gebieten liegen und die zumeist mit der pontischen Flora mehr oder weniger weit vorgedrungen sind, wie *Dianthus*-arten, *Silene otites*, *Ornithogalum*-arten, *Potentilla canescens*

Schließlich fehlen mehr oder weniger stark xeromorphe (der Trockenheit angepaßt gebaute) Pflanzen, wie *Eryngium campestre*, und besonders viele Angehörige der rauhbblättrigen Gewächse: *Echium vulgare*, *Asperugo procumbens*, *Anchusa*, *Cynoglossum* . . .

Wärmeliebende Pflanzen, wie *Zea Mais*, *Vitis vinifera* (von einigen Stöcken bei Häusern abgesehen, die durchaus nicht jedes Jahr genießbare Beeren liefern) und *Asparagus officinalis* sind auch nirgends in Kultur; von Kalk und Wärme (sonnige Hänge) liebenden Pflanzen, die sonst ausgesprochen kontinentales Klima begehren oder bevorzugen, sind *Juniperus sabina* und *Larix decidua* künstlich angepflanzt.

D. Da sowohl Flysch als auch Moränenschutt mit Ausnahme frischer „Eingänge“ überall von Humus oder Lehm bedeckt sind, fehlen alle Pflanzen, die schottrigen (steinigen) Boden bevorzugen.

E. Der See liegt 553 m über dem Meere, das Becken senkt sich noch bis Mondsee um ungefähr 70 m. Es sind viele Pflanzen ausgeschlossen, deren Vorkommen an niedrigere Lagen gebunden ist, wie *Glyceria aquatica*, *Orchis palustris*, *Potentilla supina*, *Sagittaria sagittifolia*...

F. Pflanzen, deren Träger oder Erhalter Sümpfe oder Moore sind, gehen mit fortschreitender Austrocknung solcher Gebiete immer mehr zurück oder verschwinden ganz. So sind von den in Duftschmids Flora von O. Ö. (herausgegeben ab 1870!) noch genannten Arten vom Verfasser nicht mehr oder nur sehr selten gefunden worden: *Liparis Loeselii*, *Carex limosa*, *C. pulicaris*...

G. Es fehlen im u. G. alle Pflanzen, die salzhaltigen Boden beanspruchen, wie *Atropis distans*.

H. Da nur wenige Vorgärten im u. G. existieren (Zell, Oberhofen) und selbst in diesen viele sonst gewöhnliche Gemüsepflanzen, wie *Anethum graveolens*, sehr selten sind, da ferner die Liste der in den Wurzgärten befindlichen Pflanzen nicht groß, wohl aber konstant ist, gibt es auch nur wenige verwilderte Pflanzen (Gartenflüchtlinge: *Phlox*, *Rudbeckia*, *Anaphalis*), von denen besonders jene bald eingehen, die sonst im Freien nur dann vorkommen, wenn Wärme oder Kalk ihr Fortkommen fördert. Infolge der geringen Zahl der Vorgärten und der Artenkonstanz in den Wurzgärten ist auch der Artenreichtum der Gartenunkräuter kein großer.

J. Anlässlich der geologischen Betrachtungen der Gegend wurde gesagt, daß das u. G. durchwegs dem Flysche angehört und Moränen aufgelagert hat. Die während der in der Einleitung erwähnten Beobachtungszeit aufgestellte Artenliste, insbesondere die Klassifizierung in Bezug auf das Verhalten zum Kalke, läßt einen Schluß zu, in welchem Grade die Kalkmoränen die Flyschunterlage beeinflussen. Während nämlich die Kalkböden durchlässig und trocken sind, erweisen sich die Flyschböden als ziemlich undurchlässig und feucht. Nun gibt es aber auch Pflanzen, denen die chemische Wirkung des Kalkes zusagt, die aber daneben eine große Feuchtigkeit beanspruchen; diese Pflanzen weisen im u. G. unge-

fähr 30 Arten auf. Ferner muß da an Pflanzen gedacht werden, die zweifellos nur wegen ihrer Trockenheitsansprüche oft auf Kalk zu finden sind, bei denen also nicht die chemischen Eigenschaften des Kalkes die Ursache ihrer Kalkliebe sind, sondern die einerseits auch ohne ihn, andererseits sogar in ganz entgegengesetzten Verhältnissen, wie sie das Kalkgebirge bietet, existieren können; dazu gehören die Arten, die einerseits im Kalkgebiete, andererseits auf kalklosen, „physiologisch trockenen Böden“ vorkommen. Ist nämlich wohl Wasser vorhanden, dieses aber (bei stagnierender Feuchtigkeit) zu kalt, so kann es die Pflanze nicht verwerten und man nennt solche Böden nach der Theorie von Schimper, die allerdings sehr ins Wanken gekommen ist, physiologisch trockene Böden. Diese Böden enthalten also in auffallender Weise oft die gleichen Formen wie die reinen Kalkböden. Man denke an die bemerkenswerteste der hieher gehörigen Pflanzen, an *Pinus montana*, die im nahen Kalkgebirge Höhen um 1500 m herum besetzt hält und dann wieder geschlossen in der Beckensohle des u. G. (560 m, Moor II) vorkommt.

Wenn auch, wie schon gesagt, vor allem die Feuchtigkeit der Gegend im allgemeinen dem Bestande kalkholder Pflanzen nicht günstig ist, so müssen wir doch noch nach anderen Ursachen forschen, aus denen eine an Kalkmoränen so reiche Gegend in großer Nähe des Kalkgebirges so arm ist an Kalkpflanzen.

1. In Gegenden, die geschlossen zum Kalkgebirge führen, ermöglichen oft schon einige zufällige Kalkstücke, verwesende Tierskelette, Ansammlungen von Schneckenschalen usw., verirrt kalkholden Pflanzen das Fortkommen; es würde also für den Bestand mancher kalkholden Pflanzen vollständig genügen, daß das erforderliche edaphische Substrat im u. G. bloß verstreut aufgetragen erscheint; überdies sind die Gewässer meist sehr kalkreich. Aber zwischen dem Kalk- und Flyschgebiete befindet sich eine große Kluft, vorgestellt durch Mondsee-Griesler Ache; der Übergang vom Kalk- ins Flyschgebiet erfolgt hier nicht so unvermittelt wie beispielsweise im Wienerwald, wo in bestimmten Linien Kalk- und Flyschhügel direkt ineinandergreifen. Die Pflanze fehlt, weil es ihr im Laufe der Entwicklung nicht leicht war, hieher zu gelangen; genetische und nicht edaphische Momente sind möglicherweise die Ursache des Fehlens.

Viele Kalkpflanzen sind auch, entfernt und getrennt vom Zentrum ihres Vorkommens, in dem ihnen die klimatischen Verhältnisse durchaus genehm sind und wo sie auch bodenvag werden können, oft recht wählerisch; ja dies tritt schon manchmal im Grenzgebiete zutage, so bei *Polygala comosa*; je weiter diese Pflanze nordwärts schreitet, desto mehr Kalk braucht sie, weil ihr dieser an

Wärme ersetzen muß, was ihr die geographische Lage versagt. Ähnlich verhält sich *Cynanchum vincetoxicum*, das erst mit Annäherung an seine nördliche Verbreitungsgrenze im eigentlichen Sinne kalkliebend wird. Zurückkommend auf die Verbreitungsverhinderung kalkholder Pflanzen von Süden her müssen wir in erster Linie an die Schwierigkeit der anemochoren Wanderung der Samen nach Norden denken. Erhärtet wird die Annahme, daß viele Kalkpflanzen nicht aus edaphischen, sondern aus genetischen Gründen im u. G. fehlen, durch das Vorhandensein einer Reihe ausgesprochener Kalkmoose, wie *Hypnum commutatum*, *H. falcatum*, *H. molluscum*, ferner noch *Philonotis calcarea* und *Fissidens decipiens*; die überaus leichten Moossporen können vom sanftesten Winde sehr weit getragen werden, während der anemochoren Verbreitung der Samen meist sehr bald Grenzen gezogen sind.

Es kommt noch dazu, daß Winde vom Kalk- ins Flyschgebirge sehr selten sind, und wenn sie auftreten, so meist zur Zeit, wo sie der Pflanzenverbreitung nicht zu nützen vermögen (Frühling).

2. Kalkpflanzen, die absolut kontinentalen Klimacharakter verlangen, fehlen. (Siehe klimatische Verhältnisse!)

3. Die Moränenablagerungen sind im u. G. in Höhen von 700—800 m immer zu Ende, es kommen daher überhaupt nur solche kalkfordernde Pflanzen in Betracht, die unter diese Höhenlinie herabzusteigen vermögen.

4. Infolge der früher bestandenen und zum großen Teile noch vorhandenen Versumpfung weiter Gelände des u. G. ist der Boden hier zumeist als tiefgründig zu bezeichnen. Tiefgründigkeit wirkt aber im Sinne der Ozeanität, also dem Bestande kalkholder Pflanzen entgegen. Zu geringer Kalkgehalt (Rübels Faktorenersatztablelle) wird hier nirgends durch Lockerheit des Bodens ersetzt.

5. Kalkpflanzen, die Gerölle oder direkt steinige Hänge bevorzugen, können hier im vorhinein nicht vorkommen. (*Kernera saxatilis* bei Wartenfels). Dieser Punkt deckt sich zum Teile mit dem Abschnitte D.

6. Sonstige gerne talwärts wandernde Pflanzen, die vielleicht im Moränengebiete genügend Halt fänden, werden nicht gebracht, weil der Flußlauf (Ache) alpeneinwärts, also vom Flysch gegen das Kalkgebirge, gerichtet ist, alle anderen aber dem Gebiete zuströmenden Gewässer nur vom Flysch kommen; so fehlt dem u. G. die Liste der kalkholden Schwemmpflanzen, z. B. der *Saxifraga*-arten (jenseits des Mondsees überaus häufig *Saxifraga rotundifolia*), die anderwärts bis 300 m herunterwandern. Wir vermissen besonders bekannte Talwanderer, die wieder südwärts unseres Gebietes recht häufig sind, wie *Polygonatum verticillatum*.

Da also selbst Pflanzen, die zweifellos in das Vegetationsbild der Gegend passen und hier leicht ihr Fortkommen fänden — eurytope Arten — infolge ungünstiger oder direkt verschlossener Einwanderungsmöglichkeiten von den Kalkbergen, die von solcher Nähe ins Becken grüßen, heute kaum hierher gelangen können, so muß mit um so größerer Sicherheit eine Reihe hier vorkommender nicht direkt eurytoper Pflanzen als Reliktbestand aufgefaßt werden.

Die Zunahme der Vergletscherung zwang in unserem Falle die Gebirgspflanzen, tief herabzusteigen. Die autochthone Vegetation wurde zerstört, Neuankömmlinge fanden damals infolge allgemeiner Temperaturabnahme zusagende Existenzbedingungen; die Alpenflora besetzte zum Teile den nicht vergletscherten Vorraum im Norden oder die Ränder der weit nach Norden reichenden Zungen; sie wanderte nach dem Rückzuge der Gletscher wieder südwärts und beckeneinwärts und machte hiebei zum Teile passenden Orts halt.

Die Überreste aus den ersten Eiszeiten mußten natürlich wieder zugrunde gehen, als Überbleisel aus der letzten Eiszeit her sollen unter Prüfung auf die in Hayeks Pflanzengeographie erwähnten Forderungen für Relikte^{6a)} nachstehende Arten gedeutet werden.

Aconitum napellus. Die Pflanze gehört einer arktisch-tertiären Gattung an, die im Tertiär ein geschlossenes Areale bewohnte. Durch die Eiszeiten wurde dieses Areale zerrissen. Im u. G. findet sich *A. n.* nur an einer Stelle, dort aber geschlossen und dicht in einem Umkreise von mehreren hundert Metern um das Moor I, das wie das Moor II mit *Pinus montana* in der Strauchschichte und mit *Cladonia rangiferina* in der Bodenschichte wesentlich besetzt ist.

Andromeda polifolia hält sich in erster Linie innerhalb des Jungmoränenkranzes auf und wird im u. G. bezeichnenderweise in den Mooren nordwärts des Sees, also südlich der aufgerissenen Stirnmooränen, dann in den Mooren südwärts des Sees und endlich wieder im Moore I im Gebiete des vermutlichen Südostrandes der hieher gelangten Gletscherzunge gefunden.

Vaccinium oxycoccos zeigt die gleiche Verbreitung wie *Andromeda polifolia*. Nach He. findet sich *V. o.* mit wenigen Ausnahmen immer im Bereiche der Jungmoränen der Würmvergletscherung, so auch im u. G.

Aster bellidiastrum. Die zwei getrennten Fundorte von *A. b.* liegen in ziemlich gleicher Höhe (660—680 m) symmetrisch ost- und westwärts gegenüber und scheinen so zu den beiden Seitenrändern der Gletscherzunge hinzuweisen. Vielleicht ist diese Pflanze auch deshalb der Gruppe der Reliktformen anzureihen, weil es doch

^{6a)} Vgl. Hayek, Pflanzengeographie S. 228.

sonderbar wäre, daß A. b. als einzige der von Kerner genannten kalkholden Pflanzen der Voralpen, die einerseits bis in die Alpenregionen steigen, andererseits weit herabzukommen vermögen (*Erica carnea*, *Primula auricula*, *Biscutella laevigata* usw.), in der Nacheiszeit in das u. G. gelangte.

Im östlichen Fundgebiete von A. b. zeigt sich auch reichlich *Primula farinosa*, welche Pflanze noch ostwärts und nordwärts des Sees vorkommt. Gerade die getrennten Vorkommnisse aller bis jetzt genannten Formen verleiten, sie als Relikte aufzufassen.

Als Glazialrest kann auch noch *Tofieldia calyculata* (nach Scharfetter) ebenso wie anderorts in den Alpen betrachtet werden. T. c. blieb aber nicht auf ihre ursprünglichen Orte beschränkt, sondern verbreitete sich und verbreitet sich heute noch weiter über die meisten Moorwiesen. —

Vom Gipfel des Kolomannberges aus bietet sich dem Wanderer ein entzückender Blick ins Irrseebecken, das seine heutige Form den Eismassen verdankt, welche die Bergriesen im Süden einst hiehergeschickt haben. Die vielen merkwürdigen geologischen und botanischen Andenken aus jenen Zeiten stellen eine dauernde Verbindung her zwischen dem Kalkgebirge und dem anmutigen Hügellande des Irrseebeckens.

Wenn auch der pflanzliche Artenreichtum dieser Gegend kein großer ist, so gibt es doch hier Pflanzengesellschaften (alle Arten der heimischen insektenfressenden Pflanzen, prachtvolle birkenbesetzte Flachmoorbestände, ein einzigartig schön entwickeltes Hochmoor), wie sie selten in gleich interessanter Weise in unserem Vaterlande zu finden sind. Eine Wanderung durch das Irrseebecken ist für jeden Naturfreund sehr lohnend;⁸⁵⁾ sie darf aber nur im Sinne der großen Idee des Naturschutzes erfolgen, die erfreulicherweise gerade in letzter Zeit immer mehr an Boden gewinnt.

Nachtrag.

Die Vegetationsaufnahmen wurden während der Drucklegung vorliegender Arbeit fortgesetzt. Der Pflanzenbestand einer Gegend wechselt unausgesetzt; manche Arten dringen vor, andere gehen zurück, neue Arten wandern ein, hie und da kommt eine Art zum Verschwinden. Im folgenden soll das Wesentlichste über die Neu-

⁸⁵⁾ Naderer L. schildert in ihrer Arbeit „Von Mondsee und dem Mondseeland“ eine Wanderung durch das ganze Irrseebecken; in: „Oberösterreich“, hg. von F. Berger (1925) S. 470—492.

beobachtungen im Jahre 1930 gesagt werden; manche der angeführten Arten sind wohl bis dahin übersehen worden.

Bei den Berichtigungen halfen dem Verfasser die Herren Schulrat Franz Naderer (S. N.), Oberforststrat Franz Ressel und stud. phil. Walter Reitermayr (W. R.), wofür ihnen bestens gedankt sei.

Von den Gartenpflanzen wurden die häufigsten neu genannt, da besonders in letzter Zeit die Leute im u. G. sich für fremde Formen zu interessieren scheinen. Besondere Pflege erfahren hier seit jeher die Topfpflanzen.⁶⁶⁾

Das Uferbild der Bäche wird in letzter Zeit dadurch stark beeinflußt, daß Weiden zur Regulierung verwendet werden. (Wildbachverbauung.)

Bezüglich der Einteilung der Moose soll nachgetragen werden, daß diese vom Verfasser lediglich zum Zwecke einer besseren Übersicht gemacht wurde.

Nach neuerlichen, sehr ausführlichen Mitteilungen des Herrn Direktors Josef Moosleitner beträgt der Höhenunterschied zwischen dem Seeufer und dem tiefsten Punkte der kammförmigen Wasserscheide nördlich des Sees bloß 8'56 m. (Messungen durch Herrn Ingenieur Paul Daxa.)

Herr Oberlehrer Karl Brandstötter in Zell am Moos hält die Pflanzenvorkommnisse des Irrseebeckens in Evidenz und bittet um ergänzende Angaben.

Thuja occidentalis L. (Amerikanischer Lebensbaum). Sehr selten in Kultur. S. N.

Ulmus montana L. (Bergulme). Sehr selten am Nordrande des u. G.

Polygonum hydropiper L.⁶⁷⁾ Häufig an Wasserläufen, auch südwärts des Sees.

Fagopyrum sagittatum Gilib. (Gem. Buchweizen). 7. 8. 1930 einige Exemplare in Bahnnähe.

Amarantus paniculatus L. (Rispiger Fuchsschwanz). Wurzgärten von Rabenschwand.

(*A. retroflexus* L., Rauhhaariger F., fehlt)

Melandryum album. Zerstr. in der Gegend der Haslau W. R.

Cucubalus baccifer. Fehlt.

Aconitum vulparia. Seit 1930 gruppenw. auf dem ersten Teile des Aufstieges zum Kolomann vom Südwestwinkel des Sees aus.

Anemone hepatica L. (Leberblümchen). Nur vom Südosthange des Irrsberges her und gegen das Innere des u. G. scharf abgegrenzt, ferner ein Stück die Ache von Mondsee her nordwärts wandernd.

Geum rivale. Sehr häufig in der Oberhofner Gegend. Pf. S.

Agrimonia eupatoria. Wie *Aconitum* v.

Medicago sativa. Herdenw. auf dem Damme längs des Zellerbaches im Obstgarten des Michlbauern. Reste eines Anbaues aus dem Jahre 1897.

⁶⁶⁾ Ebendort S. 471.

⁶⁷⁾ Wo in dieser Liste bloß der lateinische Name aufscheint, handelt es sich nur um die letzte Verbreitungsangabe bereits früher genannter Arten.

- Geranium pratense* L. (Wiesen-Storchschnabel). Zerstr. in der Haslau W. R.
Pelargonium sp. Burm. (Pelargonie). In vielen Arten beliebte Topfpflanze.
Impatiens balsamina L. (Balsamine). Gärten, zerstr.
I. Sultani Hook. (Sultans-B.). „Stubenhockerl“. Beliebte Topfpflanze.
Acer campestre L., f. *suberosum* Rogowicz (Feldahorn). Äußerst selten am Nordrande des u. G.
Ricinus communis L. (Wunderbaum). Selten in Gärten von Rabenschwand.
Passiflora coerulea L. (Leidensblume). Geschätzte Topfpflanze.
Begonia sp. (Schiefblatt). „Eisblume“. In vielen Abarten kultiviert.
Epilobium hirsutum L. (Zottiges Weidenröschen). Selten, Klausbach.
E. montanum L. (Berg-W.). Zerstreut auf den östl. H.
Fuchsia sp. L. (Fuchsie). Beliebte Topfpflanze.
Centaureum umbellatum. 1930 bis nördlich von Unterschwand weitergewandert.
Gentiana pneumonanthe. Verbreitet im „Föhrenmoos“ bei Pabing. (Östl. vom u. G.).
Borrago officinalis L. (Gem. Boretsch). Selten in Wurzgärten.
Echium vulgare L. (Gem. Natterkopf). 7. 8. 1930 das erste Exemplar auf dem Bahndamme.
Solanum nigrum L. (Schwarzer Nachtschatten). 4. 8. 1930 in einem feuchten Kartoffelacker bei Unterschwand.
Linaria vulgaris. 20. 7. 1930 ein Exemplar auf dem Kolomanngipfel!
Galium cruciata. Zerstreut in der Haslau. W. R.
G. verum. Seit 1930 gegen Oberhofen zu herabgewandert und selbst vereinzelt in den Flachmoorbeständen nördl. des Sees. (Adele Steinbach.)
Campanula fragilis Cyr. (Zarte Glockenblume) „Annableamerl“. Nebst anderen südlichen Arten der Glockenblumen beliebte Topfpflanze.
Solidago serotina Ait. (Spätblühende Goldrute). Seit 1930 in Wurzgärten nördl. des Sees.
Callistephus chinensis (L.) Nees (Chinesische Gartenaster). Verbreitet in Gärten.
Erigeron canadensis. 1930 bereits herdenw. in Bahnnähe.
Sonchus oleraceus L. (Gemeine Gänsedistel). Zerstr. bei Häusern.
Scheuchzeria palustris. 17. 8. 1930 einige Exemplare im Moore I. (V. Kien.)
Elodea canadensis Rich. (Kanadische Wasserpest). Seit 1930 in einem „Eisteiche“ 2 km nördlich von Mondsee, diesen ganz ausfüllend.
Typha angustifolia L. (Schmalblättriger Rohrkolben). Seit August 1930 einige Exemplare in dem Teiche wie *Elodea*.
Setaria viridis (L.) P. B. (Grünes Borstengras). Seit August 1930 gruppenw. beim „Hain“.
Poa palustris L. (Sumpf-Rispengras). Sehr zerstr., östl. von Zell in sehr feuchten Wiesen gruppenw.
Lolium multiflorum Lam. (Italienisches Raygras). Wird seit einiger Zeit auf Brachen gebaut. Zerstr. verwildert.
Zea mays. 1930 am Irrsberge und bei Mondsee probeweise gebaut.
Lilium candidum L. (Weiße Lilie). Gärten.
Iris sp. (Schwertlilie) u. *Gladiolus communis* L. (Gemeine Siegwurz) in Gärten.
Ophris muscifera Huds. (Fliegentragende Ragwurz). Selten. Langat. Pf. S.
Cephalanthera alba. Selten. Harbringer Hölzl. Pf. S.
Lathyrus odoratus L. (Wohlriechende Platterbse). Seit 1930 in Gärten.
Datura stramonium L. (Stechapfel). 17. 8. 1930 Nordrand d. u. G.

Beilage 1.

Bestandesaufnahme der Wiesen nördlich des Sees. (Nordwärts der Wasserscheide.)

Q u a d r a t e:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	Be- deckungs- grad	Kon- stanz in %
<i>A</i> <i>Chrysophyllum stellatum</i> ⁶⁸⁾	5	5	5	3	4	2	5	4	4	3	2	4	4	5	4	4	4	4	3	2	1	1	2	3'48	100
<i>Drepanocladus intermedius</i> ⁶⁹⁾	3	4	3	1	3	4	2	2	2	1	2	.	1	1	2	1	2	2	1	3	1	.	3	1'91	91
<i>Aulacomnium palustre</i> . . .	.	1	.	2	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	1	1	1	2	1	.	1	4	.	0'70	43
<i>Philonotis fontana</i> . . .	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	4	.	.	0'35	17
<i>Fissidens adiantoides</i> . . .	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0'30	30
<i>Mnium Seligeri</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	0'04	4
<i>Sphagnum</i> sp. (meist subsec.)	.	.	.	5	.	.	1	1	1	3	5	1	1	3	.	.	.	1	.	3	3	3	.	1'30	52
<i>Utricularia minor</i>	.	.	.	.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0'17	9
<i>B</i> <i>Equisetum limosum</i> . . .	.	1	.	.	2	2	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	1	.	.	1	1	.	0'52	43
<i>Rhynchospora alba</i>	5	5	4	1	3	2	3	5	5	1	1	4	1	4	1	3	2	1	2	2	.	.	3	2'52	91
<i>Carex lepidocarpa</i> ⁷⁰⁾ . . .	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0'04	4
<i>Carex Oederi</i>	3	3	2	1	.	.	1	.	.	1	1	1	.	.	1	2	.	.	.	.	.	1	.	0'74	4
<i>Carex Goodenovii</i>	.	.	.	3	2	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	2	4	.	2	2	2	1	1'04	48
<i>Trichophorum alpinum</i> . . .	.	.	.	.	2	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0'22	13
<i>Juncus articulatus</i>	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	0'30	30
<i>Molinia coerulea</i>	.	.	1	4	1	.	4	5	5	4	5	4	5	.	3	2	2	2	3	5	5	4	3	2'91	38
<i>Agrostis vulgaris</i>	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0'04	4
<i>Tofieldia calyculata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	0'04	4
<i>Salix repens</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	0'04	4

Beilage 2.

Bestandesaufnahme der Wiesen nördlich des Sees. (Südwärts der Wasserscheide.)

Q u a d r a t e:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	Be- deckungs- grad	Konstanz in %
A																						
<i>Utricularia minor</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	.	1	1	1	.	.	.	1	0'20	15
<i>Fissidens adiantoides</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	.	.	1	.	0'25	25
<i>Mnium Seligeri</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	.	.	.	.	0'10	10
<i>Drepanocladus intermedius</i>	.	1	1	.	.	1	.	.	2	1	1	1	2	2	2	1	1	.	3	.	0'95	65
<i>Chrysohypnum stellatum</i>	1	2	2	.	.	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	.	2	.	1'05	75
<i>Aulacomnium palustre</i>	1	1	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	0'45	30
<i>Polytrichum strictum</i>	.	.	.	.	4	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	0'40	20
<i>Philonotis fontana</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	.	1	.	0'20	20
<i>Climacium dendroides</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	0'05	5
<i>Sphagnum</i> sp. (meist subsec.)	2	1	3	4	1	4	2	1	1	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	.	1'10	60
<i>Lycopodium inundatum</i>	1	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0'25	15
B																						
<i>Equisetum limosum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	0'10	10
<i>Agrostis vulgaris</i>	.	.	.	.	.	1	2	1	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	0'30	25
<i>Molinia coerulea</i>	4	4	4	4	3	5	4	2	5	3	1	2	2	4	4	5	4	3	3	3	3'45	100
<i>Eriophorum angustifolium</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	0'10	10
<i>Trichophorum alpinum</i>	1	.	.	1	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	1	0'35	35
<i>Rhynchospora alba</i>	1	.	.	2	.	1	2	4	3	.	2	2	1	1	1	2	1	.	2	2	1'20	65
<i>Carex lepidocarpa</i>	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	1	1	1	.	1	.	0'30	30
<i>Carex Oederi</i>	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	1	1	.	.	.	.	0'30	30
<i>Carex Goodenovii</i>	2	2	2	1	.	.	1	1	1	2	4	4	3	1	2	1	4	1	2	1	1'75	90
<i>Salix repens</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	2	.	.	0'35	30
<i>Betula pubescens</i>	.	1	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	0'35	25
<i>Drosera rotundifolia</i>	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	.	.	.	1	1	0'40	35

